

Les
PUBLICATIONS
DU QUÉBEC

ET LA SANTÉ, ÇA VA VA ?

TOME 2

Rapport de l'enquête
SANTÉ QUÉBEC 1987



Québec 

ET LA SANTÉ, ÇA VA ?

TOME 2

Rapport de l'enquête
SANTÉ QUÉBEC 1987

Cette enquête a été réalisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux conjointement avec les départements de santé communautaire.

Cette édition a été produite par

Les Publications du Québec

1279, boul. Charest Ouest

Québec (Québec)

G1N 4K7

Direction de l'enquête: Aline Emond, Santé Québec

Réalisation des entrevues: SORECOM

Les commentaires et les demandes de renseignements sur la présente publication peuvent être adressées à:

Santé Québec

505, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 400

Montréal (Québec)

H3A 3C2

(514) 842-5320

ou aux auteurs des sections dont les noms apparaissent dans le volume.

Dépôt légal — 4^e trimestre 1988

Bibliothèque nationale du Québec

Bibliothèque nationale du Canada

ISBN 2-551-08294-3

© Gouvernement du Québec

**ET LA SANTÉ,
ÇA VA ?**

TOME 2

BIBLIOTHÈQUE ADMINISTRATIVE
Ministère des communications du Québec
Éléments de catalogage avant publication

Et la santé, ça va ? : rapport de l'enquête Santé Québec 1987/[...réalisée par le Ministère de la santé et des services sociaux conjointement avec les départements de santé communautaire; comité de rédaction: Aline Emond...et al.]. — [Québec]: Ministère de la santé et des services sociaux, 1988.

2 t.: ill., graph.

Réalisation des entrevues: Sorecom.

Bibliogr.

ISBN: 2-551-08293-5 (t.1)

ISBN: 2-551-08294-3 (t.2)

1. Santé — Enquêtes 2. Santé publique — Québec (Province) — Enquêtes 3. Indicateurs de santé — Québec (Province) — Enquêtes I. Emond, Aline II. Québec (Province). Ministère de la santé et des services sociaux.
S2 A1 S25

Avis au lecteur

Les tableaux sont présentés selon les divisions du Volume I. Ils proviennent de compilations généralement demandées par les auteurs ou ont été recalculés par eux selon leurs besoins, en excluant les inconnus. Les tableaux où les inconnus apparaissent ont été utilisés dans l'analyse en établissant les proportions sur des totaux desquels on avait écarté les inconnus.

Les données sont tirées de l'enquête Santé Québec menée en 1987 sur un échantillon de 13 760 ménages privés.

Table des matières

| | |
|---|----|
| INTRODUCTION | 1 |
| PARTIE 1 CERTAINS DÉTERMINANTS | 3 |
| Chapitre 1 | |
| Habitudes de vie | 4 |
| 1.1 Consommation d'alcool | 4 |
| Tableau 1 Type de buveurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 4 |
| Tableau 2 Quantité hebdomadaire d'alcool consommé, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 5 |
| Tableau 3 Quantité hebdomadaire d'alcool consommé, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... | 6 |
| Tableau 4 Consommation hebdomadaire d'alcool, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... | 6 |
| Tableau 5 Consommation hebdomadaire d'alcool, selon le statut d'activité, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... | 7 |
| Tableau 6 Fréquence de consommation d'alcool, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... | 7 |
| Tableau 7 Risques reliés à la consommation d'alcool, (indice CAGE), selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 8 |
| Tableau 8 Personnes dépendantes de l'alcool, (indice DSM III), selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 8 |
| 1.2 Consommation de drogue | 9 |
| Tableau 9 Consommation de drogue, selon l'âge, en pourcentage, hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 9 |
| Tableau 10 Consommation de drogue, selon l'âge, en pourcentage, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 10 |
| Tableau 11 Consommation de drogue, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 11 |

| | |
|--|----|
| Tableau 12 | |
| Consommation de drogue, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 12 |
| 1.3 Consommation de tabac | 12 |
| Tableau 13 | |
| Type de fumeurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, Québec, 1987 | 12 |
| Tableau 14 | |
| Type de fumeurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 13 |
| Tableau 15 | |
| Type de fumeurs, selon l'état matrimonial, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 14 |
| Tableau 16 | |
| Type de fumeurs, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 14 |
| Tableau 17 | |
| Type de fumeurs, selon la scolarité relative*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 14 |
| Tableau 18 | |
| Type de fumeurs, selon l'indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... | 15 |
| Tableau 19 | |
| Fumeurs réguliers, selon le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 15 |
| Tableau 20 | |
| Anciens fumeurs réguliers, selon le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 15 |
| 1.4 Alimentation | 16 |
| Tableau 21 | |
| Fréquence du petit déjeuner, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 16 |
| Tableau 22 | |
| Fréquence du petit déjeuner, selon l'indice du niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 16 |
| Tableau 23 | |
| Personnes qui suivent un régime alimentaire, selon le problème de santé et le type de prescription, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 17 |
| 1.5 Sommeil | 18 |
| Tableau 24 | |
| Catégories de sommeil, selon certaines conditions de travail, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... | 18 |
| Tableau 25 | |
| Heures de sommeil, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 18 ans et plus, Québec, 1987 | 19 |

| | |
|--|-----------|
| Tableau 26 | |
| Heures de sommeil, selon la catégorie professionnelle, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 19 |
| 1.7 Indice pondéral et désir de maigrir | 20 |
| Tableau 27 | |
| Indice pondéral*, selon l'état matrimonial, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 20 |
| Tableau 28 | |
| Indice pondéral*, selon la langue parlée habituellement, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 21 |
| Tableau 29 | |
| Indice pondéral*, selon le niveau de revenu*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 22 |
| Tableau 30 | |
| Poids désiré, selon le poids réel et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 23 |
| Tableau 31 | |
| Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 24 |
| Tableau 31a | |
| Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 26 |
| Tableau 31b | |
| Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 28 |
| 1.8 Indice de saines habitudes de vie..... | 30 |
| Tableau 32 | |
| Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 30 |
| Tableau 33 | |
| Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 32 |
| Tableau 34 | |
| Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 34 |
| Tableau 35 | |
| Indice de saines habitudes de vie*, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 36 |
| Tableau 36 | |
| Indice de saines habitudes de vie*, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 36 |
| Tableau 37 | |
| Indice de saines habitudes de vie*, selon la catégorie professionnelle, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 36 |

| | |
|---|----|
| Chapitre 2 | |
| Comportements préventifs | 37 |
| 2.1 Comportements reliés aux véhicules moteurs | 37 |
| Tableau 38 | |
| Port de la ceinture de sécurité, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 37 |
| Tableau 39 | |
| Port de la ceinture de sécurité, selon le statut, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 38 |
| Tableau 40 | |
| Port de la ceinture de sécurité en automobile, selon la scolarité*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 39 |
| Tableau 41 | |
| Répartition des utilisateurs d'automobile, selon le statut des personnes, le nombre de kilomètres parcourus, le sexe et le port de la ceinture de sécurité, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 40 |
| Tableau 42 | |
| Port du casque de sécurité en motocyclette, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 40 |
| Tableau 43 | |
| Répartition des utilisateurs de véhicule tout terrain, selon qu'ils portent ou non le casque de sécurité, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 40 |
| Tableau 44 | |
| Port du casque de sécurité en véhicule tout terrain, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... | 41 |
| Tableau 45 | |
| Port de la ceinture de sécurité en automobile, selon le type de buveurs et la consommation hebdomadaire, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 42 |
| 2.2 Comportements spécifiques aux femmes | 43 |
| Tableau 46 | |
| Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 43 |
| Tableau 47 | |
| Fréquence de l'auto-examen des seins, selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 44 |
| Tableau 48 | |
| Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 45 |
| Tableau 49 | |
| Délai depuis la dernière mammographie et fréquence de la mammographie, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 46 |
| Tableau 50 | |
| Délai depuis la dernière mammographie, selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 50 à 59 ans, Québec, 1987 | 46 |

| | |
|--|----|
| Tableau 51 | |
| Consommation de contraceptifs oraux, selon l'âge et le tabagisme, femmes âgées de 15 à 44 ans, Québec, 1987 | 47 |
| Tableau 52 | |
| Consommation de contraceptifs oraux, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 48 |
| Tableau 53 | |
| Consommation de médicaments à teneur hormonale pour problèmes reliés à la ménopause, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 48 |
| Tableau 54 | |
| Délais depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 49 |
| Tableau 55 | |
| Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon la consommation de contraceptifs oraux et l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 49 |
| Tableau 56 | |
| Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 50 |
| Tableau 57 | |
| Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon la fréquence de l'auto-examen des seins, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 50 |
| Tableau 58 | |
| Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le délai depuis la dernière mammographie, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 51 |
| Tableau 59 | |
| Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 51 |
| Chapitre 3 | |
| Environnement social | 52 |
| 3.1 Support social | 52 |
| Tableau 60 | |
| Indice d'intégration sociale*, selon ses composantes, le sexe et l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987.... | 52 |
| Tableau 61 | |
| Support perçu, selon ses composantes, le sexe et l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 53 |
| Tableau 62 | |
| Support perçu, selon la scolarité*, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 53 |

| | |
|---|----|
| Tableau 63 | |
| Support perçu, selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 54 |
| Tableau 64 | |
| Support perçu, selon l'activité, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 54 |
| Tableau 65 | |
| Support perçu et événements stressants avant l'âge de 12 ans, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 54 |
| 3.2 Événements stressants | 55 |
| Tableau 66 | |
| Fréquence de certains événements stressants*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 55 |
| Tableau 67 | |
| Indice d'événements stressants*, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 55 |
| Tableau 68 | |
| Indice d'événements stressants*, selon l'état matrimonial, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 55 |
| Tableau 69 | |
| Indice d'événements stressants*, selon différents événements de la vie, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 56 |
| Tableau 70 | |
| Personnes ayant un indice élevé d'événements stressants*, selon le statut d'activité, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 56 |
| Tableau 71 | |
| Problèmes de santé de longue durée et indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 et plus, Québec, 1987 | 57 |
| Tableau 72 | |
| Restriction d'activité et indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 57 |
| PARTIE 2 L'ÉTAT DE SANTÉ | 59 |
| Chapitre 4 | |
| Santé physique | 60 |
| 4.1 Fréquence et nature des problèmes de santé | 60 |
| Tableau 73 | |
| Problèmes de santé, selon l'âge et le sexe, nombre et taux pour 100 habitants, Québec, 1987..... | 60 |
| Tableau 74 | |
| Nombre et pourcentage des individus ayant déclaré des problèmes de santé, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987..... | 62 |

| | |
|---|----|
| Tableau 75 | |
| Problèmes de santé, selon l'âge, nombre et taux pour 100 habitants, (Enquête Santé Canada), Québec, 1978-1979..... | 63 |
| Tableau 76a | |
| Problèmes de santé, selon l'activité chez les hommes, nombre et taux pour 100 hommes, Québec, 1987..... | 64 |
| Tableau 76b | |
| Problèmes de santé, selon l'activité chez les femmes, nombre et taux pour 100 femmes, Québec, 1987..... | 65 |
| Tableau 77 | |
| Problèmes de santé, selon le niveau de revenu, nombre et taux pour 100 habitants, Québec, 1987..... | 66 |
| 4.2 Accidents | 67 |
| Tableau 78 | |
| Accidents de travail, selon les conditions de travail, l'âge et le sexe, population âgée de 15 à 64 ans, Québec, 1987..... | 67 |
| Tableau 79a | |
| Taux d'accidents, selon le type d'accidents et la catégorie professionnelle, population active âgée de 15 ans et plus, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987..... | 67 |
| Tableau 79b | |
| Distribution des types d'accidents, selon la catégorie professionnelle et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 68 |
| Tableau 79c | |
| Distribution de la population, selon les types d'accidents, la catégorie professionnelle et le sexe, population active âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 68 |
| Tableau 80a | |
| Distribution de la population, selon les types d'accidents, le statut d'activité et le sexe, population active âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 69 |
| Tableau 80b | |
| Taux d'accidents, selon le statut d'activité, population active âgée de ans et plus, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987..... | 70 |
| Tableau 81 | |
| Accidents de travail, selon l'âge, le sexe et l'occupation, population active de 15 à 64 ans, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987..... | 71 |
| Tableau 82 | |
| Lésions et accidents, selon l'âge, le sexe et l'occupation, population active de 15 à 64 ans, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987..... | 72 |
| 4.3 Indice de santé globale | 73 |
| Tableau 83 | |
| Indice de santé globale*, selon le sexe, la scolarité*, l'indice de saines habitudes de vie*, la satisfaction face à la vie sociale, la détresse psychologique* et les événements stressants*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 73 |

| | |
|---|----|
| Tableau 84 | |
| Indice de santé globale*, selon l'âge, le sexe et le niveau de revenu*, Québec, 1987..... | 74 |
| Tableau 85 | |
| Indice de santé globale*, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987 | 74 |
| Chapitre 5 | |
| Santé mentale | 75 |
| Tableau 86 | |
| Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987..... | 75 |
| Tableau 87 | |
| Détresse psychologique*, selon l'état matrimonial, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 78 |
| Tableau 88 | |
| Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 79 |
| Tableau 89 | |
| Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 81 |
| Tableau 90 | |
| Détresse psychologique*, selon l'indice d'événements stressants*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 83 |
| Tableau 91 | |
| Détresse psychologique*, selon la satisfaction face à la vie sociale, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 83 |
| Tableau 92 | |
| Détresse psychologique*, selon l'indice de santé globale*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 84 |
| Tableau 93 | |
| Détresse psychologique*, selon la scolarité*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 85 |
| Chapitre 6 | |
| Perception de l'état de santé des Québécois | 86 |
| Tableau 94a | |
| Probabilité moyenne standardisée de l'indice de santé globale* selon la perception de l'état de santé et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987 | 86 |
| Tableau 94b | |
| Probabilité moyenne de l'indice de santé globale*, selon la perception de l'état de santé, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987..... | 86 |
| Tableau 95 | |
| Perception de l'état de santé, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 et plus, Québec, 1987..... | 87 |

| | |
|--|-----|
| Chapitre 7 | |
| Problèmes sociaux | 88 |
| Tableau 96 | |
| Problèmes rapportés par un tiers — Distribution de l'échantillon selon le sexe, l'état matrimonial et l'âge, Québec, 1987..... | 88 |
| PARTIE 3 LES CONSÉQUENCES | 89 |
| Chapitre 8 | |
| Incapacité | 90 |
| 8.1 Incapacité | 90 |
| Tableau 97 | |
| Cause principale de l'incapacité à long terme, selon le sexe et l'âge, en pourcentage, Québec, 1987..... | 90 |
| Chapitre 10 | |
| Recours aux services et consommation de médicaments | 91 |
| 10.1 Recours aux services | 91 |
| Tableau 98 | |
| Nombre d'hospitalisations au cours des 12 derniers mois, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités, Québec, 1987 | 91 |
| Tableau 99 | |
| Consultation de professionnels de la santé, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités et le type de professionnels consultés, Québec, 1987 | 92 |
| Tableau 100 | |
| Personnes qui ont consulté au moins 1 fois au cours des 2 dernières semaines, selon le type de professionnel, l'âge et le sexe, Québec, 1987 | 94 |
| Tableau 101 | |
| Personnes qui ont consulté au moins 1 fois au cours des 2 dernières semaines, selon le type de professionnel et le niveau de revenu*, Québec, 1987..... | 94 |
| Tableau 102 | |
| Lieu de consultation, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités, Québec, 1987 | 96 |
| Tableau 103 | |
| Lieu de la dernière consultation, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987 | 97 |
| Tableau 104 | |
| Lieu de la dernière consultation, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987 | 98 |
| Tableau 105 | |
| Distribution des fréquences de consultation au cours des 4 derniers mois, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987 | 99 |
| Tableau 106 | |
| Motif de consultation, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987 | 100 |

Tableau 107

Motif de consultation, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987 100

Tableau 108

Motif de consultation, selon le lieu de consultation, Québec, 1987... 102

Tableau 109

Distribution des problèmes de santé, selon la fréquence de consultation au cours des 4 derniers mois, Québec, 1987..... 102

Introduction

L'enquête Santé Québec est la première enquête générale de santé menée conjointement par le MSSS et les 32 DSC du Québec. Elle a nécessité la collaboration de plusieurs organismes dont le Bureau de la Statistique du Québec pour la conception du plan de sondage et la firme privée SORECOM quant à la réalisation des entrevues.

Les résultats de ce volume sont une démonstration plus exhaustive de certains tableaux présentés au rapport d'analyse (Volume I). Ils prennent leur signification comme complément aux textes du Volume I pour un lecteur intéressé à plus de précisions.

La méthodologie de l'enquête est expliquée succinctement au Volume I et le lecteur trouvera dans les cahiers techniques (liste à l'Annexe I) l'information complémentaire. Les « * » réfèrent au lexique du Volume I.

PARTIE 1

Certains déterminants

Chapitre 1

Habitudes de vie

1.1

Consommation d'alcool

Tableau 1
Type de buveurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage,
population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Type de buveurs | | | | Population estimée |
|---------|------|-----------------|--------|-------------|----------|--------------------|
| | | Abstinent | Ancien | Occasionnel | Habituel | |
| Total | H | 8,9 | 6,2 | 13,8 | 71,1 | 2 447 485 |
| | F | 20,3 | 4,9 | 25,1 | 49,7 | 2 574 473 |
| 15-24 | H | 13,7 | 2,7 | 17,0 | 66,6 | 507 116 |
| | F | 13,1 | 3,0 | 26,8 | 57,1 | 495 876 |
| 25-44 | H | 4,8 | 3,7 | 13,5 | 78,0 | 1 082 511 |
| | F | 12,0 | 3,1 | 28,2 | 56,7 | 1 099 836 |
| 45-64 | H | 8,6 | 8,7 | 12,5 | 70,2 | 614 514 |
| | F | 25,9 | 6,7 | 22,8 | 44,6 | 651 038 |
| 65 et + | H | 18,4 | 18,4 | 11,2 | 52,0 | 243 344 |
| | F | 48,0 | 10,0 | 17,0 | 25,0 | 327 723 |

Tableau 2
**Quantité hebdomadaire d'alcool consommé, selon l'âge et le sexe,
 population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987**

| Âge | Sexe | Nombre de consommations par semaine | | | Population estimée |
|--------------|----------|--|-------------|-------------|--------------------|
| | | 0-6 | 7-13 | 14 et + | |
| 15-17 | H | 79,9 | 15,2 | 4,9 | 60 990 |
| | F | 85,7 | 9,8 | 4,5 | 52 519 |
| | T | 82,6 | 12,7 | 4,7 | 113 509 |
| 18-19 | H | 65,4 | 21,0 | 13,6 | 66 046 |
| | F | 78,8 | 8,0 | 12,5 | 57 481 |
| | T | 71,6 | 15,3 | 13,1 | 123 527 |
| 20-24 | H | 59,6 | 21,2 | 19,2 | 199 341 |
| | F | 82,4 | 12,2 | 5,4 | 165 647 |
| | T | 70,0 | 17,2 | 12,9 | 364 988 |
| 25-29 | H | 64,2 | 18,3 | 17,5 | 211 644 |
| | F | 83,0 | 13,8 | 3,2 | 173 254 |
| | T | 72,7 | 16,3 | 11,0 | 384 898 |
| 30-34 | H | 57,8 | 23,2 | 19,0 | 224 471 |
| | F | 83,0 | 14,0 | 3,0 | 160 858 |
| | T | 68,6 | 19,4 | 12,3 | 385 329 |
| 35-39 | H | 58,6 | 20,6 | 20,8 | 207 489 |
| | F | 82,2 | 12,8 | 4,9 | 153 722 |
| | T | 68,6 | 17,3 | 14,1 | 361 210 |
| 40-44 | H | 62,0 | 18,0 | 20,0 | 182 992 |
| | F | 81,1 | 14,0 | 4,9 | 126 867 |
| | T | 69,8 | 16,3 | 13,8 | 309 860 |
| 45-49 | H | 60,9 | 21,2 | 17,9 | 133 944 |
| | F | 84,6 | 11,8 | 3,6 | 102 686 |
| | T | 71,2 | 17,1 | 11,6 | 236 630 |
| 50-54 | H | 63,2 | 21,0 | 15,8 | 104 986 |
| | F | 77,8 | 14,2 | 8,0 | 64 884 |
| | T | 68,8 | 18,4 | 12,8 | 169 869 |
| 55-59 | H | 57,2 | 24,4 | 18,4 | 88 697 |
| | F | 88,8 | 8,3 | 2,9 | 62 077 |
| | T | 70,2 | 17,8 | 12,0 | 150 774 |
| 60-64 | H | 59,0 | 21,9 | 19,0 | 77 398 |
| | F | 80,4 | 11,9 | 7,7 | 43 639 |
| | T | 66,8 | 18,3 | 14,9 | 121 037 |
| 65-69 | H | 64,3 | 19,2 | 16,5 | 54 474 |
| | F | 84,5 | 5,3 | 10,2 | 40 173 |
| | T | 72,9 | 13,3 | 13,8 | 94 647 |
| 70-74 | H | 61,7 | 18,2 | 20,1 | 34 013 |
| | F | 78,8 | 13,9 | 7,3 | 16 176 |
| | T | 67,2 | 16,8 | 15,9 | 50 189 |
| 75-96 | H | 70,6 | 24,2 | 5,2 | 26 927 |
| | F | 80,6 | 12,9 | 6,5 | 20 785 |
| | T | 75,0 | 19,3 | 5,7 | 47 712 |
| Total | H | 61,6 | 20,6 | 17,8 | 1 673 411 |
| | F | 82,6 | 12,3 | 5,1 | 1 240 767 |
| | T | 70,5 | 17,1 | 12,4 | 2 914 178 |

Tableau 3
Quantité hebdomadaire d'alcool consommé, selon l'âge et le sexe,
en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Nombre de consommations par semaine | | | | | | Population estimée |
|--------------|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | Aucune | 1-6 | 7-13 | 14-28 | 29 et + | Inconnu | |
| Total | H | 30,8 | 38,2 | 14,0 | 9,1 | 3,1 | 4,8 | 2 479 402 |
| | F | 47,5 | 39,6 | 6,0 | 2,1 | 0,3 | 4,5 | 2 630 965 |
| 15-24 | H | 36,5 | 36,3 | 13,0 | 7,9 | 2,1 | 4,2 | 513 594 |
| | F | 45,9 | 40,3 | 6,2 | 3,4 | 0,3 | 3,9 | 502 342 |
| 25-44 | H | 24,0 | 43,0 | 15,4 | 11,2 | 3,5 | 2,9 | 1 086 608 |
| | F | 40,7 | 47,2 | 7,7 | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 1 108 106 |
| 45-64 | H | 31,2 | 35,8 | 14,4 | 8,1 | 3,5 | 7,0 | 625 917 |
| | F | 49,5 | 37,3 | 4,9 | 1,9 | 0,2 | 6,2 | 669 286 |
| 65 et + | H | 47,8 | 27,0 | 9,5 | 4,6 | 2,2 | 8,9 | 253 283 |
| | F | 67,9 | 19,3 | 2,1 | 1,8 | 0,1 | 8,8 | 351 231 |

Tableau 4
Consommation hebdomadaire d'alcool, selon le niveau de revenu*,
en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de revenu | Nombre de consommations par semaine | | | Total |
|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 0 à 6 | 7 à 13 | 14 et + | |
| Très pauvre | 308 247 | 23 384 | 17 962 | 349 593 |
| | 6,97 | 0,53 | 0,41 | 7,90 |
| | 88,17 | 6,69 | 5,14 | |
| | 8,51 | 5,00 | 5,37 | |
| Pauvre | 580 014 | 44 165 | 34 532 | 658 711 |
| | 13,11 | 1,00 | 0,78 | 14,89 |
| | 88,05 | 6,70 | 5,24 | |
| | 16,02 | 9,45 | 10,33 | |
| À revenu moyen | 1 997 682 | 255 330 | 170 165 | 2 423 177 |
| | 45,16 | 5,77 | 3,85 | 54,78 |
| | 82,44 | 10,54 | 7,02 | |
| | 55,16 | 54,62 | 50,88 | |
| Riche | 735 601 | 144 570 | 111 788 | 991 960 |
| | 16,63 | 3,27 | 2,53 | 22,43 |
| | 74,16 | 14,57 | 11,27 | |
| | 20,31 | 30,93 | 33,42 | |
| Total | 3 621 545 | 467 448 | 334 447 | 4 423 440 |
| | 81,87 | 10,57 | 7,56 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 686 927

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 5
**Consommation hebdomadaire d'alcool, selon le statut d'activité,
 en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987**

| Statut d'activité | Nombre de consommations par semaine | | | Total |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 0 à 6 | 7 à 13 | 14 et + | |
| Travail | 1 945 455 | 346 016 | 254 344 | 2 545 815 |
| | 39,93 | 7,10 | 5,22 | 52,25 |
| | 76,42 | 13,59 | 9,99 | |
| | 48,60 | 68,57 | 69,74 | |
| Études | 437 039 | 45 517 | 23 665 | 506 221 |
| | 8,97 | 0,93 | 0,49 | 10,39 |
| | 86,33 | 8,99 | 4,67 | |
| | 10,92 | 9,02 | 6,49 | |
| Tient maison | 804 328 | 31 914 | 21 092 | 857 333 |
| | 16,51 | 0,65 | 0,43 | 17,60 |
| | 93,82 | 3,72 | 2,46 | |
| | 20,09 | 6,32 | 5,78 | |
| Inactif/santé | 192 616 | 12 380 | 9 468 | 214 464 |
| | 3,95 | 0,25 | 0,19 | 4,40 |
| | 89,81 | 5,77 | 4,41 | |
| | 4,81 | 2,45 | 2,60 | |
| Inactif/autres | 623 662 | 68 784 | 56 147 | 748 593 |
| | 12,80 | 1,41 | 1,15 | 15,36 |
| | 83,31 | 9,19 | 7,50 | |
| | 15,58 | 13,63 | 15,39 | |
| Total | 4 003 099 | 504 610 | 364 716 | 4 872 426 |
| | 82,16 | 10,36 | 7,49 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 237 941

Légende:

population estimée
 pourcentage sur le total
 pourcentage sur la ligne
 pourcentage sur la colonne

Tableau 6
**Fréquence de consommation d'alcool, selon l'âge et le sexe, en pourcentage,
 population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987**

| Âge | Sexe | À chaque jour | Fréquence de consommation | | | | Non buveur | Population estimée |
|---------|------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| | | | 4-6 fois/sem. | 2-3 fois/sem. | 1 fois/sem. | - 1 fois/sem. | | |
| Total | H | 6,7 | 7,8 | 19,3 | 19,3 | 31,7 | 15,2 | 2 447 485 |
| | F | 1,6 | 2,7 | 8,7 | 16,4 | 45,4 | 25,2 | 2 574 473 |
| 15-24 | H | 0,7 | 3,7 | 18,0 | 22,4 | 38,8 | 16,4 | 507 116 |
| | F | 0,1 | 0,7 | 10,2 | 20,2 | 52,7 | 16,1 | 495 876 |
| 25-44 | H | 5,3 | 9,7 | 21,4 | 21,9 | 33,2 | 8,5 | 1 082 511 |
| | F | 1,3 | 3,5 | 10,3 | 18,3 | 51,5 | 15,1 | 1 099 836 |
| 45-64 | H | 12,5 | 8,5 | 19,4 | 15,2 | 27,1 | 17,3 | 614 514 |
| | F | 2,4 | 3,6 | 7,1 | 15,4 | 38,9 | 32,6 | 651 039 |
| 65 et + | H | 11,0 | 6,5 | 12,1 | 11,3 | 22,3 | 36,8 | 243 344 |
| | F | 3,3 | 1,7 | 4,2 | 6,1 | 26,6 | 58,1 | 327 723 |

Tableau 7
Risques reliés à la consommation d'alcool, (indice CAGE), selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Nul | Faible | Élevé | Inconnu | Population estimée |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------|
| Total | H | 67,7 | 13,6 | 14,8 | 3,9 | 2 478 750 |
| | F | 82,3 | 6,9 | 5,2 | 5,6 | 2 628 966 |
| 15-24 | H | 71,0 | 14,0 | 12,2 | 2,8 | 513 594 |
| | F | 80,9 | 9,6 | 6,8 | 2,7 | 501 433 |
| 25-44 | H | 66,1 | 14,0 | 17,6 | 2,3 | 1 086 324 |
| | F | 83,0 | 7,9 | 6,4 | 2,7 | 1 107 832 |
| 45-64 | H | 65,5 | 14,2 | 15,1 | 5,2 | 625 704 |
| | F | 81,9 | 5,6 | 4,1 | 8,4 | 668 826 |
| 65 et + | H | 72,9 | 9,6 | 7,5 | 10,0 | 253 128 |
| | F | 82,6 | 2,4 | 1,5 | 13,5 | 350 875 |

Tableau 8
Personnes dépendantes de l'alcool, (indice DSM III), selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Dépendance à l'alcool | Pas de dépendance | Inconnu | Population estimée |
|--------------|----------|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Total | H | 10,0 | 88,1 | 1,9 | 2 419 471 |
| | F | 2,8 | 93,7 | 3,5 | 2 556 663 |
| 15-24 | H | 8,7 | 90,0 | 1,3 | 503 559 |
| | F | 5,3 | 92,5 | 2,2 | 496 176 |
| 25-44 | H | 11,9 | 87,0 | 1,1 | 1 071 889 |
| | F | 3,3 | 95,5 | 1,2 | 1 089 328 |
| 45-64 | H | 9,9 | 87,4 | 2,7 | 606 074 |
| | F | 1,5 | 93,8 | 4,7 | 639 393 |
| 65 et + | H | 4,1 | 90,6 | 5,3 | 237 949 |
| | F | 0,3 | 89,6 | 10,1 | 331 766 |

1.2
**Consommation
 de drogue**

Tableau 9
**Consommation de drogue, selon l'âge, en pourcentage, hommes âgés
 de 15 ans et plus, Québec, 1987**

| Âge | Type de drogues | | | Total |
|--------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Marijuana seulement | Drogues fortes | Pas de drogue | |
| 15-24 | 86 078 | 64 069 | 348 206 | 498 353 |
| | 3,64 | 2,71 | 14,72 | 21,07 |
| | 17,27 | 12,86 | 69,87 | |
| | 29,72 | 24,31 | 19,22 | |
| 25-44 | 192 438 | 168 559 | 702 568 | 1 063 565 |
| | 8,14 | 7,13 | 29,71 | 44,97 |
| | 18,09 | 15,85 | 66,06 | |
| | 66,45 | 63,96 | 38,78 | |
| 45-64 | 10 253 | 22 822 | 549 036 | 582 110 |
| | 0,43 | 0,96 | 23,22 | 24,61 |
| | 1,76 | 3,92 | 94,32 | |
| | 3,54 | 8,66 | 30,30 | |
| 65 et + | 820 | 8 070 | 212 044 | 220 935 |
| | 0,03 | 0,34 | 8,97 | 9,34 |
| | 0,37 | 3,65 | 95,98 | |
| | 0,28 | 3,06 | 11,70 | |
| Total | 289 588 | 263 520 | 1 811 854 | 2 364 963 |
| | 12,24 | 11,14 | 76,61 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 114 439

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 10

Consommation de drogue, selon l'âge, en pourcentage, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Type de drogues | | | Total |
|--------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Marijuana seulement | Drogues fortes | Pas de drogue | |
| 15-24 | 80 812 | 52 658 | 355 370 | 488 839 |
| | 3,32 | 2,16 | 14,59 | 20,07 |
| | 16,53 | 10,77 | 72,70 | |
| | 38,37 | 23,78 | 17,73 | |
| 25-44 | 126 168 | 116 378 | 835 023 | 1 077 568 |
| | 5,18 | 4,78 | 34,28 | 44,24 |
| | 11,71 | 10,80 | 77,49 | |
| | 59,90 | 52,55 | 41,67 | |
| 45-64 | 3 638 | 37 631 | 553 606 | 594 874 |
| | 0,15 | 1,54 | 22,73 | 24,42 |
| | 0,61 | 6,33 | 93,06 | |
| | 1,73 | 16,99 | 27,63 | |
| 65 et + | 0 | 14 792 | 259 884 | 274 676 |
| | 0,00 | 0,61 | 10,67 | 11,28 |
| | 0,00 | 5,39 | 94,61 | |
| | 0,00 | 6,68 | 12,97 | |
| Total | 210 617 | 221 458 | 2 003 883 | 2 435 958 |
| | 8,65 | 9,09 | 82,26 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 195 007

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 11
Consommation de drogue, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Scolarité | Type de drogues | | | Total |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Marijuana seulement | Drogues fortes | Pas de drogue | |
| Quintile 1 | 58 046 1,23 7,17 11,65 | 95 844 2,03 11,84 20,03 | 655 901 13,90 81,00 17,52 | 809 790 17,16 |
| Quintile 2 | 89 312 1,89 10,26 17,93 | 91 976 1,95 10,56 19,22 | 689 455 14,61 79,18 18,42 | 870 743 18,45 |
| Quintile 3 | 77 801 1,65 8,65 15,62 | 79 907 1,69 8,89 16,70 | 741 298 15,71 82,46 19,81 | 899 006 19,05 |
| Quintile 4 | 125 808 2,67 12,28 25,26 | 103 013 2,18 10,06 21,52 | 795 363 16,85 77,66 21,25 | 1 024 184 21,70 |
| Quintile 5 | 147 075 3,12 13,18 29,53 | 107 868 2,29 9,67 22,54 | 860 870 18,24 77,15 23,00 | 1 115 813 23,64 |
| Total | 498 042 10,55 | 478 607 10,14 | 3 742 886 79,31 | 4 719 535 100,00 |

Valeurs manquantes = 390 832

Légende :

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 12

Consommation de drogue, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de revenu | Type de drogues | | | Total |
|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Marijuana seulement | Drogues fortes | Pas de drogue | |
| Très pauvre | 27 794 | 44 268 | 271 482 | 343 545 |
| | 0,64 | 1,02 | 6,23 | 7,88 |
| | 8,09 | 12,89 | 79,02 | |
| | 5,95 | 9,83 | 7,89 | |
| Pauvre | 54 788 | 66 481 | 515 008 | 636 277 |
| | 1,26 | 1,53 | 11,82 | 14,60 |
| | 8,61 | 10,45 | 80,94 | |
| | 11,72 | 14,76 | 14,97 | |
| À revenu moyen | 269 227 | 247 476 | 1 874 464 | 2 391 167 |
| | 6,18 | 5,68 | 43,01 | 54,87 |
| | 11,26 | 10,35 | 78,39 | |
| | 57,60 | 54,95 | 54,48 | |
| Riche | 115 632 | 92 105 | 779 421 | 987 158 |
| | 2,65 | 2,11 | 17,88 | 22,65 |
| | 11,71 | 9,33 | 78,96 | |
| | 24,74 | 20,45 | 22,66 | |
| Total | 467 442 | 450 330 | 3 440 375 | 4 358 147 |
| | 10,73 | 10,33 | 78,94 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 752 220

Légende:

population estimée

pourcentage sur le total

pourcentage sur la ligne

pourcentage sur la colonne

Tableau 13

Type de fumeurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Type de fumeur | | | | Population estimée |
|--------------|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | Jamais fumé | Ancien | Occasionnel | Régulier | |
| Total | | 32,8 | 28,8 | 5,0 | 33,4 | 5 061 167 |
| | H | 27,1 | 33,2 | 4,5 | 35,2 | 2 455 625 |
| | F | 38,2 | 24,7 | 5,5 | 31,6 | 2 630 965 |
| 15-24 | H | 50,7 | 14,9 | 6,1 | 28,3 | 511 379 |
| | F | 37,8 | 19,0 | 8,9 | 34,3 | 498 173 |
| 25-44 | H | 23,0 | 32,2 | 4,4 | 40,4 | 1 080 587 |
| | F | 29,3 | 27,7 | 5,6 | 37,4 | 1 105 373 |
| 45-64 | H | 16,8 | 43,2 | 3,8 | 36,2 | 617 804 |
| | F | 41,1 | 26,2 | 4,4 | 28,3 | 661 694 |
| 65 et + | H | 21,6 | 50,0 | 3,1 | 25,3 | 245 857 |
| | F | 61,2 | 20,7 | 2,5 | 15,6 | 340 302 |

1.3

Consommation
de tabac

Tableau 14
Type de fumeurs, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Jamais fumé | Ancien | Occasionnel | Régulier |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15-17 | H | 60,4 | 12,7 | 6,5 | 20,4 |
| | F | 46,8 | 16,7 | 10,6 | 25,9 |
| | T | 53,8 | 14,6 | 8,5 | 23,1 |
| 18-19 | H | 54,6 | 14,9 | 5,5 | 25,0 |
| | F | 42,0 | 16,7 | 12,4 | 28,9 |
| | T | 48,2 | 15,8 | 9,9 | 27,0 |
| 20-24 | H | 43,8 | 16,2 | 6,0 | 33,9 |
| | F | 31,4 | 21,2 | 6,7 | 40,7 |
| | T | 37,7 | 18,7 | 6,3 | 37,3 |
| 25-29 | H | 31,0 | 24,5 | 4,6 | 39,9 |
| | F | 28,2 | 25,2 | 4,2 | 41,9 |
| | T | 29,5 | 25,2 | 4,4 | 40,9 |
| 30-34 | H | 21,6 | 32,6 | 4,5 | 41,4 |
| | F | 25,3 | 28,3 | 6,4 | 40,2 |
| | T | 23,4 | 30,5 | 5,3 | 40,8 |
| 35-39 | H | 20,0 | 32,3 | 5,3 | 42,5 |
| | F | 33,1 | 28,8 | 6,3 | 31,8 |
| | T | 26,7 | 30,5 | 5,8 | 37,0 |
| 40-44 | H | 18,9 | 40,7 | 3,0 | 37,4 |
| | F | 31,0 | 27,8 | 5,9 | 35,3 |
| | T | 24,9 | 34,2 | 4,5 | 36,4 |
| 45-49 | H | 15,5 | 44,9 | 5,0 | 34,6 |
| | F | 36,5 | 27,9 | 2,7 | 32,9 |
| | T | 26,5 | 36,1 | 3,8 | 33,7 |
| 50-54 | H | 15,5 | 43,5 | 4,9 | 36,1 |
| | F | 33,5 | 27,0 | 3,6 | 35,9 |
| | T | 24,8 | 35,0 | 4,2 | 36,0 |
| 55-59 | H | 15,6 | 41,3 | 3,9 | 39,2 |
| | F | 46,3 | 22,9 | 7,3 | 23,5 |
| | T | 31,9 | 31,5 | 5,7 | 30,9 |
| 60-64 | H | 21,1 | 43,1 | 0,8 | 35,0 |
| | F | 49,4 | 27,0 | 4,2 | 19,5 |
| | T | 35,2 | 35,0 | 2,5 | 27,3 |
| 65 et + | H | 21,6 | 50,0 | 3,1 | 25,3 |
| | F | 61,2 | 20,7 | 2,5 | 15,6 |
| | T | 44,6 | 33,0 | 2,7 | 19,6 |

Tableau 15

Type de fumeurs, selon l'état matrimonial, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| État matrimonial | Jamais fumé | Ancien | Occasionnel | Régulier | Population estimée |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Marié(e) | 28,5 | 33,3 | 4,2 | 38,0 | 3 285 980 |
| Séparé(e) — divorcé(e) | 19,8 | 23,4 | 6,3 | 50,5 | 407 098 |
| Veuf(ve) | 46,1 | 26,7 | 4,1 | 23,1 | 248 509 |
| Seul(e) | 47,8 | 17,9 | 7,2 | 27,1 | 972 466 |
| Total | 32,5 | 29,1 | 5,0 | 33,4 | 4 914 053 |

Tableau 16

Type de fumeurs, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de revenu | Jamais fumé | Ancien | Occasionnel | Régulier | Population estimée |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Très pauvre | 32,3 | 18,5 | 4,2 | 45,0 | 370 813 |
| Pauvre | 36,1 | 24,4 | 5,4 | 34,1 | 695 093 |
| À revenu moyen | 30,7 | 30,4 | 4,9 | 34,0 | 2 508 148 |
| Riche | 32,5 | 33,8 | 5,2 | 28,5 | 1 014 319 |
| Total | 32,1 | 29,3 | 5,0 | 33,6 | 4 588 323 |

313

Tableau 17

Type de fumeurs, selon la scolarité relative*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Scolarité relative | Jamais fumé | Ancien | Occasionnel | Régulier | Population estimée |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Quintile 1 | 29,1 | 21,5 | 4,4 | 45,0 | 876 488 |
| Quintile 2 | 31,0 | 27,1 | 4,5 | 37,4 | 926 755 |
| Quintile 3 | 31,8 | 29,9 | 4,7 | 33,6 | 950 542 |
| Quintile 4 | 31,4 | 31,3 | 5,3 | 32,0 | 1 067 403 |
| Quintile 5 | 38,1 | 33,2 | 6,1 | 22,6 | 1 143 241 |
| Total | 32,5 | 29,0 | 5,1 | 33,4 | 4 961 429 |

Tableau 18
Type de fumeurs, selon l'indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Indice d'événements stressants | Jamais fumé | Ancien | Occasionnel | Régulier | Population estimée |
|--------------------------------|-------------|--------|-------------|----------|--------------------|
| Aucun événement | 34,2 | 29,8 | 4,8 | 31,2 | 2 647 263 |
| Faible | 32,6 | 29,2 | 5,4 | 32,8 | 1 105 395 |
| Moyen | 29,0 | 28,2 | 4,3 | 38,4 | 60 748 2 |
| Élevé | 28,0 | 25,4 | 5,8 | 40,8 | 563 071 |

Tableau 19
Fumeurs réguliers, selon le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Nombre de cigarettes fumées quotidiennement | | | Population estimée |
|--------------|------|---|-------------|-------------|--------------------|
| | | 1-10 | 11-25 | 26 et + | |
| Total | | 18,4 | 65,2 | 16,4 | 1 679 982 |
| | H | 15,8 | 64,3 | 19,9 | 860 384 |
| | F | 21,2 | 66,0 | 12,8 | 819 598 |
| 15-24 | H | 24,5 | 68,6 | 6,9 | 1 438 971 |
| | F | 32,9 | 62,4 | 4,7 | 170 624 |
| 25-44 | H | 12,7 | 64,9 | 22,4 | 435 075 |
| | F | 15,2 | 69,0 | 15,8 | 412 402 |
| 45-64 | H | 13,8 | 59,3 | 26,9 | 221 656 |
| | F | 20,4 | 64,4 | 15,2 | 185 143 |
| 65 et + | H | 25,1 | 67,6 | 7,3 | 59 755 |
| | F | 33,1 | 60,2 | 6,7 | 51 430 |

Tableau 20
Anciens fumeurs réguliers, selon le nombre de cigarettes fumées quotidiennement, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Nombre de cigarettes fumées quotidiennement | | | Population estimée |
|--------------|------|---|-------------|-------------|--------------------|
| | | 1-10 | 11-25 | 26 et + | |
| Total | | 16,2 | 57,8 | 26,0 | 1 003 062 |
| | H | 10,4 | 57,9 | 31,7 | 622 798 |
| | F | 25,7 | 57,5 | 16,8 | 380 264 |
| 15-24 | H | 28,1 | 54,3 | 17,6 | 17 336 |
| | F | 36,8 | 54,2 | 9,0 | 35 631 |
| 25-44 | H | 9,4 | 64,6 | 26,0 | 261 544 |
| | F | 20,5 | 59,8 | 19,7 | 199 913 |
| 45-64 | H | 7,9 | 54,2 | 37,9 | 235 931 |
| | F | 30,9 | 55,2 | 13,9 | 103 942 |
| 65 et + | H | 15,3 | 50,6 | 34,1 | 107 987 |
| | F | 27,7 | 55,4 | 16,9 | 40 778 |

1.4
Alimentation

Tableau 21
Fréquence du petit déjeuner, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Petit déjeuner | | | Population estimée |
|--------------|------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| | | À chaque jour | Quelquefois | Rarement/jamais | |
| Total | | 73,6 | 17,6 | 8,7 | 5 110 367 |
| 15-24 | H | 64,5 | 25,1 | 10,4 | 513 593 |
| | F | 64,1 | 25,7 | 10,3 | 502 342 |
| 25-44 | H | 64,0 | 24,2 | 11,8 | 1 086 607 |
| | F | 71,5 | 18,7 | 9,8 | 1 108 105 |
| 45-64 | H | 80,8 | 12,3 | 6,9 | 625 916 |
| | F | 83,5 | 10,5 | 5,9 | 669 285 |
| 65 et + | H | 93,5 | 3,1 | 3,4 | 253 285 |
| | F | 91,7 | 5,6 | 2,7 | 351 233 |

Tableau 22
Fréquence du petit déjeuner, selon l'indice du niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de revenu | Petit déjeuner | | | Population estimée |
|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| | À chaque jour | Quelquefois | Rarement/jamais | |
| Très pauvre | 64,8 | 22,3 | 12,3 | 3 369 892 |
| Pauvre | 72,8 | 16,7 | 9,3 | 827 391 |
| À revenu moyen | 73,1 | 17,6 | 8,8 | 403 160 |
| Riche | 75,1 | 17,6 | 6,9 | 28 819 |

Tableau 23

Personnes qui suivent un régime alimentaire, selon le problème de santé et le type de prescription, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Prescription | Problèmes de santé | | | | | | | Total |
|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Diabète | Hypertension | Maladie cardiaque | Ulc. gast. et duod. | Trouble digestif | Autre digestif | Autres | |
| Oui, par un médecin | 41 556 | 21 202 | 12 534 | 4 762 | 6 172 | 13 108 | 86 759 | 186 092 |
| | 12,65 | 6,45 | 3,81 | 1,45 | 1,88 | 3,99 | 26,40 | 56,64 |
| | 22,33 | 11,39 | 6,74 | 2,56 | 3,32 | 7,04 | 46,62 | |
| | 74,05 | 84,23 | 84,70 | 88,51 | 55,75 | 83,60 | 43,30 | |
| Non | 1 232 | 289 | 116 | 248 | 1 162 | 83 | 63 336 | 66 466 |
| | 0,38 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,35 | 0,03 | 19,28 | 20,23 |
| | 1,85 | 0,43 | 0,17 | 0,37 | 1,75 | 0,12 | 95,29 | |
| | 2,20 | 1,15 | 0,78 | 4,61 | 10,49 | 0,53 | 31,61 | |
| Oui, par une diététiste | 11 171 | 2 562 | 1 989 | 81 | 1 484 | 594 | 25 704 | 43 585 |
| | 3,40 | 0,78 | 0,61 | 0,02 | 0,45 | 0,18 | 7,82 | 13,26 |
| | 25,63 | 5,88 | 4,56 | 0,19 | 3,41 | 1,36 | 58,97 | |
| | 19,91 | 10,18 | 13,44 | 1,51 | 13,41 | 3,79 | 12,83 | |
| Oui, par une association | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 616 | 7 616 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,32 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | |
| Oui, autres | 1 052 | 1 118 | 60 | 0 | 1 863 | 1 233 | 3 576 | 19 002 |
| | 0,32 | 0,34 | 0,05 | 0,00 | 0,57 | 0,38 | 4,13 | 5,78 |
| | 5,54 | 5,89 | 0,84 | 0,00 | 9,81 | 6,49 | 71,44 | |
| | 1,87 | 4,44 | 1,08 | 0,00 | 16,83 | 7,87 | 6,78 | |
| Oui, inconnu | 1 105 | 0 | 0 | 289 | 389 | 660 | 2 535 | 5 818 |
| | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,20 | 1,03 | 1,77 |
| | 56,81 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 11,59 | 4,20 | 1,26 | |
| | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 3,51 | 4,21 | 1,69 | |
| Total | 56 116 | 25 170 | 14 799 | 5 380 | 11 070 | 15 678,3 | 200 365 | 328 580 |
| | 17,08 | 7,66 | 4,50 | 1,64 | 3,37 | 4,77 | 60,98 | 100,00 |

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne



Tableau 24

Catégories de sommeil, selon certaines conditions de travail, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Conditions de travail | Manque de sommeil | Sommeil recommandé | Surplus de sommeil | Total |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Travail de nuit | 14 830 | 40 551 | 9 324 | 64 705 |
| | 0,51 | 1,40 | 0,32 | 2,23 |
| | 22,92 | 62,67 | 14,41 | |
| | 4,01 | 1,88 | 2,45 | |
| Travail de jour | 235 819 | 1 529 942 | 247 904 | 2 013 664 |
| | 8,12 | 52,66 | 8,53 | 69,31 |
| | 11,71 | 75,98 | 12,31 | |
| | 63,81 | 70,97 | 65,25 | |
| Sur quarts | 33 984 | 202 216 | 34 645 | 270 845 |
| | 1,17 | 6,96 | 1,19 | 9,32 |
| | 12,55 | 74,66 | 12,79 | |
| | 9,20 | 9,38 | 9,12 | |
| Sur appel | 20 889 | 97 857 | 29 260 | 148 005 |
| | 0,72 | 3,37 | 1,01 | 5,09 |
| | 14,11 | 66,12 | 19,77 | |
| | 5,65 | 4,54 | 7,70 | |
| Horaire fixe | 7 071 | 34 574 | 6 791 | 48 436 |
| | 0,24 | 1,19 | 0,23 | 1,67 |
| | 14,60 | 71,38 | 14,02 | |
| | 1,91 | 1,60 | 1,79 | |
| Autre | 56 969 | 250 653 | 51 978 | 359 600 |
| | 1,96 | 8,63 | 1,79 | 12,38 |
| | 15,84 | 69,70 | 14,45 | |
| | 15,42 | 11,63 | 13,68 | |
| Total | 369 562 | 2 155 792 | 379 901 | 2 905 254 |
| | 12,72 | 74,20 | 13,08 | 100,00 |

Valeurs manquantes: 132 954

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 25
Heures de sommeil, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 18 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Heures de sommeil | | | Population estimée |
|--------------|------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | Moins de 7 h | 7 à 8 h | 9 h et + | |
| 18-24 | H | 10,1 | 66,9 | 23,0 | 357 122 |
| | F | 6,6 | 66,4 | 27,0 | 354 717 |
| 25-34 | H | 11,8 | 74,7 | 13,5 | 569 600 |
| | F | 7,1 | 73,2 | 19,7 | 578 748 |
| 35-44 | H | 16,7 | 75,1 | 8,2 | 517 008 |
| | F | 9,0 | 73,1 | 17,9 | 529 357 |
| 45-54 | H | 17,6 | 73,0 | 9,4 | 331 708 |
| | F | 15,2 | 70,2 | 14,6 | 356 397 |
| 55-64 | H | 16,1 | 70,0 | 13,9 | 294 209 |
| | F | 17,3 | 67,9 | 14,8 | 312 888 |
| 65 et + | H | 16,8 | 56,6 | 26,6 | 253 285 |
| | F | 21,5 | 54,6 | 23,9 | 351 233 |
| Total | | 13,2 | 69,6 | 17,2 | 4 806 271 |

Tableau 26
Heures de sommeil, selon la catégorie professionnelle, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Catégorie professionnelle | Heures de sommeil | | | Population estimée |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | Moins de 7 h | 7 à 8 h | 9 h et + | |
| Col blanc/direction | 11,1 | 77,6 | 11,3 | 801 867 |
| Col blanc/administration | 10,1 | 76,6 | 13,3 | 814 226 |
| Col bleu/primaire | 13,2 | 73,0 | 13,8 | 75 342 |
| Col bleu/secondaire | 15,7 | 73,3 | 11,0 | 490 896 |
| Col bleu/tertiaire | 16,2 | 69,8 | 14,0 | 587 524 |
| Total | 12,7 | 74,8 | 12,5 | 2 769 855 |

1.7

Indice pondéral
et désir de
maigrir

Tableau 27

Indice pondéral*, selon l'état matrimonial, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de poids | État matrimonial | | | | | Population estimée |
|-------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | Marié(e) | Séparé(e)-divorcé(e) | Veuf(ve) | Seul(e) | Inconnu | |
| Poids insuffisant | 208 452 | 38 552 | 17 195 | 161 141 | 19 467 | 444 806 |
| | 4,22 | 0,78 | 0,35 | 3,26 | 0,39 | 9,00 |
| | 46,86 | 8,67 | 3,87 | 36,23 | 4,38 | |
| | 6,50 | 9,66 | 7,48 | 16,68 | 14,07 | |
| Poids normal | 1 664 380 | 228 121 | 88 218 | 584 394 | 64 917 | 2 630 031 |
| | 33,69 | 4,62 | 1,79 | 11,83 | 1,31 | 53,24 |
| | 63,28 | 8,67 | 3,35 | 22,22 | 2,47 | |
| | 51,90 | 57,14 | 38,38 | 60,48 | 46,92 | |
| Excès de poids | 981 365 | 96 833 | 75 644 | 151 762 | 19 523 | 1 325 127 |
| | 19,86 | 1,96 | 1,53 | 3,07 | 0,40 | 26,82 |
| | 74,06 | 7,31 | 5,71 | 11,45 | 1,47 | |
| | 30,60 | 24,25 | 32,91 | 15,71 | 14,11 | |
| Obésité | 300 009 | 28 524 | 36 233 | 47 050 | 9 535 | 421 352 |
| | 6,07 | 0,58 | 0,73 | 0,95 | 0,199 | 8,53 |
| | 71,20 | 6,77 | 8,60 | 11,17 | 2,26 | |
| | 9,36 | 7,14 | 15,76 | 4,87 | 6,89 | |
| Autres | 52 529 | 7 212 | 12 561 | 21 857 | 24 921 | 119 080 |
| | 1,06 | 0,15 | 0,25 | 0,44 | 0,50 | 2,41 |
| | 44,11 | 6,06 | 10,55 | 18,36 | 20,93 | |
| | 1,64 | 1,81 | 5,46 | 2,26 | 18,01 | |
| Total | 3 206 735 | 399 243 | 229 850 | 966 204 | 138 363 | 4 940 399 |
| | 64,91 | 8,08 | 4,65 | 19,56 | 2,80 | 100,00 |

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 28
**Indice pondéral*, selon la langue parlée habituellement, population âgée
de 15 ans et plus, Québec, 1987**

| Niveau de poids | Langue parlée | | | | Population estimée |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| | Français | Anglais | Autre | Inconnue | |
| Poids insuffisant | 378 113 | 52 008 | 8 400 | 6 286 | 444 806 |
| | 7,65 | 1,05 | 0,17 | 0,13 | 9,00 |
| | 85,01 | 11,69 | 1,89 | 1,41 | |
| | 9,25 | 8,08 | 5,86 | 9,46 | |
| Poids normal | 2 185 852 | 357 187 | 60 210 | 26 782 | 2 630 031 |
| | 44,24 | 7,23 | 1,22 | 0,54 | 53,24 |
| | 83,11 | 13,58 | 2,29 | 1,02 | |
| | 53,48 | 55,51 | 41,98 | 40,30 | |
| Excès de poids | 1 102 131 | 169 031 | 44 656 | 9 309 | 1 325 127 |
| | 22,31 | 3,42 | 0,90 | 0,19 | 26,82 |
| | 83,17 | 12,76 | 3,37 | 0,70 | |
| | 26,97 | 26,27 | 31,14 | 14,01 | |
| Obésité | 341 307 | 52 747 | 21 490 | 5 808 | 421 352 |
| | 6,91 | 1,07 | 0,43 | 0,12 | 8,53 |
| | 81,00 | 12,52 | 5,10 | 1,38 | |
| | 8,35 | 8,20 | 14,98 | 8,74 | |
| Autres | 79 642 | 12 498 | 8 660 | 18 279 | 119 080 |
| | 1,61 | 0,25 | 0,18 | 0,37 | 2,41 |
| | 66,88 | 10,50 | 7,27 | 15,35 | |
| | 1,95 | 1,94 | 6,04 | 27,50 | |
| Total | 4 087 046 | 643 470 | 143 415 | 66 464 | 4 940 396 |
| | 82,73 | 13,02 | 2,90 | 1,35 | 100,00 |

Légende :
population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 29

Indice pondéral*, selon le niveau de revenu*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de poids | Niveau de revenu | | | | | Population estimée |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | Très pauvre | Pauvre | À revenu moyen | Riche | Inconnu | |
| Poids insuffisant | 44 005 | 67 053 | 213 782 | 80 513 | 39 453 | 444 806 |
| | 0,89 | 1,36 | 4,33 | 1,63 | 0,80 | 9,00 |
| | 9,89 | 15,07 | 48,06 | 18,10 | 8,87 | |
| | 12,25 | 10,08 | 8,71 | 8,03 | 8,59 | |
| Poids normal | 187 444 | 323 052 | 1 315 245 | 570 588 | 233 701 | 2 630 031 |
| | 3,79 | 6,54 | 26,62 | 11,55 | 4,73 | 53,24 |
| | 7,13 | 12,28 | 50,01 | 21,70 | 8,89 | |
| | 52,17 | 48,58 | 53,60 | 56,89 | 50,90 | |
| Excès de poids | 80 716 | 177 532 | 656 949 | 286 997 | 122 934 | 1 325 127 |
| | 1,63 | 3,59 | 13,30 | 5,81 | 2,49 | 26,82 |
| | 6,09 | 13,40 | 49,58 | 21,66 | 9,28 | |
| | 22,47 | 26,70 | 26,77 | 28,62 | 26,77 | |
| Obésité | 35 993 | 71 564 | 219 735 | 54 267 | 39 794 | 421 352 |
| | 0,73 | 1,45 | 4,45 | 1,10 | 0,81 | 8,53 |
| | 8,54 | 16,98 | 52,15 | 12,88 | 9,44 | |
| | 10,02 | 10,76 | 8,95 | 5,41 | 8,67 | |
| Autres | 11 124 | 25 811 | 48 325 | 10 542 | 23 278 | 119 080 |
| | 0,23 | 0,52 | 0,98 | 0,21 | 0,47 | 2,41 |
| | 9,34 | 21,68 | 40,58 | 8,85 | 19,55 | |
| | 3,10 | 3,88 | 1,97 | 1,05 | 5,07 | |
| Total | 359 282 | 665 012 | 2 454 036 | 1 002 906 | 459 160 | 494 039 |
| | 7,27 | 13,46 | 49,67 | 20,30 | 9,29 | 100,00 |

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 30
Poids désiré, selon le poids réel et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de poids | Sexe | Poids désiré | | | | Population estimée |
|-------------------|----------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Augmentation | Concordance | Diminution légère | Grande diminution | |
| Poids insuffisant | H | 79,1 | 17,8 | 2,3 | 0,8 | 208 760 |
| | F | 54,4 | 32,6 | 11,8 | 1,2 | 192 019 |
| | T | 67,3 | 24,9 | 6,9 | 1,0 | 400 779 |
| Poids normal | H | 30,8 | 30,1 | 33,0 | 6,1 | 1 166 649 |
| | F | 7,9 | 18,8 | 56,4 | 16,9 | 1 228 657 |
| | T | 19,0 | 24,3 | 45,0 | 11,6 | 2 395 306 |
| Excès de poids | H | 2,4 | 9,4 | 47,7 | 40,5 | 686 649 |
| | F | 0,5 | 2,9 | 25,7 | 70,9 | 577 065 |
| | T | 1,5 | 6,4 | 37,6 | 54,4 | 1 263 714 |
| Obésité | H | 0,6 | 3,4 | 9,2 | 86,8 | 165 632 |
| | F | 0,1 | 1,2 | 7,2 | 91,5 | 244 495 |
| | T | 0,3 | 2,1 | 8,0 | 89,6 | 410 127 |
| Total | H | 24,3 | 20,6 | 32,9 | 22,2 | 2 227 690 |
| | F | 9,1 | 14,0 | 39,3 | 37,5 | 2 242 236 |
| | T | 16,7 | 17,3 | 36,1 | 29,9 | 4 469 926 |

Tableau 31
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Poids insuffisant | Poids normal | Excès de poids | Obésité | Autres | Total |
|-------|-------------------|--------------|----------------|---------|--------|----------------|
| 15-19 | 109 993 | 294 997 | 47 813 | 10 579 | 17 364 | 480 746 |
| | 2,23 | 5,97 | 0,97 | 0,21 | 0,35 | 9,73 |
| | 22,88 | 61,36 | 9,95 | 2,20 | 3,61 | |
| | 24,73 | 11,22 | 3,61 | 2,51 | 14,58 | |
| 20-24 | 68 761 | 331 374 | 75 509 | 24 760 | 10 757 | 511 162 |
| | 1,39 | 6,71 | 1,53 | 0,50 | 0,22 | 10,35 |
| | 13,45 | 64,83 | 14,77 | 4,84 | 2,10 | |
| | 15,46 | 12,60 | 5,70 | 5,88 | 9,03 | |
| 25-29 | 58 454 | 342 302 | 120 252 | 24 107 | 7 186 | 552 301 |
| | 1,18 | 6,93 | 2,43 | 0,49 | 0,15 | 11,18 |
| | 10,58 | 61,98 | 21,77 | 4,36 | 1,30 | |
| | 13,14 | 13,02 | 9,07 | 5,72 | 6,03 | |
| 30-34 | 48 382 | 319 811 | 130 738 | 39 747 | 5 975 | 544 654 |
| | 0,98 | 6,47 | 2,65 | 0,80 | 0,12 | 11,02 |
| | 8,88 | 58,72 | 24,00 | 7,30 | 1,10 | |
| | 10,88 | 12,16 | 9,87 | 9,43 | 5,02 | |
| 35-39 | 32 561 | 317 779 | 161 547 | 45 562 | 5 740 | 563 188 |
| | 0,66 | 6,43 | 3,27 | 0,92 | 0,12 | 11,40 |
| | 5,78 | 56,43 | 28,68 | 8,09 | 1,02 | |
| | 7,32 | 12,08 | 12,19 | 10,81 | 4,82 | |
| 40-44 | 25 066 | 246 540 | 148 560 | 49 487 | 5 997 | 475 650 |
| | 0,51 | 4,99 | 3,01 | 1,00 | 0,12 | 9,63 |
| | 5,27 | 51,83 | 31,23 | 10,40 | 1,26 | |
| | 5,64 | 9,37 | 11,21 | 11,74 | 5,04 | |
| 45-49 | 13 413 | 170 954 | 148 115 | 42 556 | 7 083 | 382 122 |
| | 0,27 | 3,46 | 3,00 | 0,86 | 0,14 | 7,73 |
| | 3,51 | 44,74 | 38,76 | 11,14 | 1,85 | |
| | 3,02 | 6,50 | 11,18 | 10,10 | 5,95 | |
| 50-54 | 17 135 | 134 730 | 99 730 | 39 642 | 7 040 | 298 276 |
| | 0,35 | 2,73 | 2,02 | 0,80 | 0,14 | 6,04 |
| | 5,74 | 45,17 | 33,44 | 13,29 | 2,36 | |
| | 3,85 | 5,12 | 7,53 | 9,41 | 5,91 | |
| 55-59 | 15 374 | 122 350 | 119 549 | 42 838 | 7 926 | 308 037 |
| | 0,31 | 2,48 | 2,42 | 0,87 | 0,16 | 6,24 |
| | 4,99 | 39,72 | 38,81 | 13,91 | 2,57 | |
| | 3,46 | 4,65 | 9,02 | 10,17 | 6,66 | |
| 60-64 | 12 157 | 115 308 | 95 749 | 48 086 | 6 554 | 277 854 |
| | 0,25 | 2,33 | 1,94 | 0,97 | 0,13 | 5,62 |
| | 4,38 | 41,50 | 34,46 | 17,31 | 2,36 | |
| | 2,73 | 4,38 | 7,23 | 11,41 | 5,50 | |
| 65-69 | 12 852 | 98 617 | 84 217 | 25 724 | 10 242 | 231 653 |
| | 0,26 | 2,00 | 1,70 | 0,52 | 0,21 | 4,69 |
| | 5,55 | 42,57 | 36,35 | 11,10 | 4,42 | |
| | 2,89 | 3,75 | 6,36 | 6,11 | 8,60 | |
| 70-74 | 12 653 | 62 062 | 49 934 | 16 017 | 8 280 | 148 947 |
| | 0,26 | 1,26 | 1,01 | 0,32 | 0,17 | 3,01 |
| | 8,50 | 41,67 | 33,52 | 10,75 | 5,56 | |
| | 2,84 | 2,36 | 3,77 | 3,80 | 6,95 | |

Tableau 31 (suite)

Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Poids insuffisant | Poids normal | Excès de poids | Obésité | Autres | Total |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 75-79 | 8 161 | 45 574 | 22 006 | 7 655 | 12 609 | 96 006 |
| | 0,17 | 0,92 | 0,45 | 0,15 | 0,26 | 1,94 |
| | 8,50 | 47,47 | 22,92 | 7,97 | 13,13 | |
| | 1,83 | 1,73 | 1,66 | 1,82 | 10,59 | |
| 80-84 | 5 799 | 17 192 | 17 636 | 4 241 | 5 577 | 50 445 |
| | 0,12 | 0,35 | 0,36 | 0,09 | 0,11 | 1,02 |
| | 11,49 | 34,08 | 34,96 | 8,41 | 11,06 | |
| | 1,30 | 0,65 | 1,33 | 1,01 | 4,68 | |
| 85-89 | 2 750 | 7 854 | 3 405 | 349 | 749 | 15 107 |
| | 0,06 | 0,16 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,31 |
| | 18,20 | 51,99 | 22,54 | 2,31 | 4,96 | |
| | 0,62 | 0,30 | 0,26 | 0,08 | 0,63 | |
| 90-94 | 476 | 908 | 0 | 0 | 0 | 1 384 |
| | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 34,40 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 et + | 820 | 1 678 | 368 | 0 | 0 | 2 866 |
| | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | 28,60 | 58,55 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,18 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 444 806 | 2 630 031 | 1 325 127 | 421 352 | 119 080 | 4 940 396 |
| | 9,00 | 53,24 | 26,82 | 8,53 | 2,41 | 100,00 |

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 31a
Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les hommes âgés de 15 ans et plus,
Québec, 1987

| Âge | Poids insuffisant | Poids normal | Excès de poids | Obésité | Autres | Total |
|-------|-------------------|--------------|----------------|---------|--------|----------------|
| 15-19 | 69 538 | 141 514 | 22 788 | 5 084 | 8 752 | 247 677 |
| | 2,80 | 5,71 | 0,92 | 0,21 | 0,35 | 9,99 |
| | 28,08 | 57,14 | 9,20 | 2,05 | 3,53 | |
| | 30,56 | 10,83 | 3,14 | 2,99 | 17,25 | |
| 20-24 | 32 729 | 170 906 | 42 119 | 14 960 | 5 203 | 265 917 |
| | 1,32 | 6,89 | 1,70 | 0,60 | 0,21 | 10,73 |
| | 12,31 | 64,27 | 15,84 | 5,63 | 1,96 | |
| | 14,38 | 13,08 | 5,81 | 8,81 | 10,26 | |
| 25-29 | 24 050 | 175 888 | 69 389 | 9 696 | 2 602 | 281 625 |
| | 0,97 | 7,09 | 2,80 | 0,39 | 0,10 | 11,36 |
| | 8,54 | 62,45 | 24,64 | 3,44 | 0,92 | |
| | 10,57 | 13,46 | 9,58 | 5,71 | 5,13 | |
| 30-34 | 23 859 | 159 381 | 82 619 | 19 628 | 2 488 | 287 975 |
| | 0,96 | 6,43 | 3,33 | 0,79 | 0,10 | 11,61 |
| | 8,29 | 55,35 | 28,69 | 6,82 | 0,86 | |
| | 10,48 | 12,20 | 11,40 | 11,55 | 4,90 | |
| 35-39 | 12 948 | 146 464 | 93 591 | 21 841 | 3 132 | 277 977 |
| | 0,52 | 5,91 | 3,77 | 0,88 | 0,13 | 11,21 |
| | 4,66 | 52,69 | 33,67 | 7,86 | 1,13 | |
| | 5,69 | 11,21 | 12,91 | 12,86 | 6,17 | |
| 40-44 | 10 626 | 119 282 | 84 623 | 20 872 | 3 628 | 239 031 |
| | 0,43 | 4,81 | 3,41 | 0,84 | 0,15 | 9,64 |
| | 4,45 | 49,90 | 35,40 | 8,73 | 1,52 | |
| | 4,67 | 9,13 | 11,68 | 12,29 | 7,15 | |
| 45-49 | 6 492 | 75 098 | 82 416 | 17 159 | 3 597 | 184 762 |
| | 0,26 | 3,03 | 3,32 | 0,69 | 0,15 | 7,45 |
| | 3,51 | 40,65 | 44,61 | 9,29 | 1,95 | |
| | 2,85 | 5,75 | 11,37 | 10,10 | 7,09 | |
| 50-54 | 7 464 | 67 202 | 53 000 | 15 574 | 3 706 | 146 946 |
| | 0,30 | 2,71 | 2,14 | 0,63 | 0,15 | 5,93 |
| | 5,08 | 45,73 | 36,07 | 10,60 | 2,52 | |
| | 3,28 | 5,14 | 7,31 | 9,17 | 7,31 | |
| 55-59 | 8 554 | 66 262 | 59 922 | 12 140 | 2 895 | 149 773 |
| | 0,35 | 2,67 | 2,42 | 0,49 | 0,12 | 6,04 |
| | 5,71 | 44,24 | 40,01 | 8,11 | 1,93 | |
| | 3,76 | 5,07 | 8,27 | 7,15 | 5,71 | |
| 60-64 | 8 793 | 63 308 | 52 207 | 15 704 | 4 423 | 144 436 |
| | 0,35 | 2,55 | 2,11 | 0,63 | 0,18 | 5,83 |
| | 6,09 | 43,83 | 36,15 | 10,87 | 3,06 | |
| | 3,86 | 4,85 | 7,20 | 9,24 | 8,72 | |
| 65-69 | 6 735 | 49 638 | 36 594 | 9 269 | 1 999 | 104 234 |
| | 0,27 | 2,00 | 1,48 | 0,37 | 0,08 | 4,20 |
| | 6,46 | 47,62 | 35,11 | 8,89 | 1,92 | |
| | 2,96 | 3,80 | 5,05 | 5,46 | 3,94 | |

Tableau 31b

Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Poids insuffisant | Poids normal | Excès de poids | Obésité | Autres | Total |
|-------|-------------------|--------------|----------------|---------|--------|----------------|
| 15-19 | 40 455 | 153 483 | 25 025 | 5 495 | 8 612 | 233 070 |
| | 1,64 | 6,24 | 1,02 | 0,22 | 0,35 | 9,47 |
| | 17,36 | 65,85 | 10,74 | 2,36 | 3,70 | |
| | 18,62 | 11,60 | 4,17 | 2,18 | 12,60 | |
| 20-24 | 36 032 | 160 468 | 33 390 | 9 801 | 5 554 | 245 245 |
| | 1,46 | 6,52 | 1,36 | 0,40 | 0,23 | 9,97 |
| | 14,69 | 65,43 | 13,61 | 4,00 | 2,26 | |
| | 16,59 | 12,12 | 5,56 | 3,90 | 8,13 | |
| 25-29 | 34 404 | 166 414 | 50 863 | 14 411 | 4 583 | 270 676 |
| | 1,40 | 6,76 | 2,07 | 0,59 | 0,19 | 11,00 |
| | 12,71 | 61,48 | 18,79 | 5,32 | 1,69 | |
| | 15,84 | 12,57 | 8,47 | 5,73 | 6,71 | |
| 30-34 | 24 524 | 160 430 | 48 119 | 20 119 | 3 487 | 256 679 |
| | 1,00 | 6,52 | 1,96 | 0,82 | 0,14 | 10,43 |
| | 9,55 | 62,50 | 18,75 | 7,84 | 1,36 | |
| | 11,29 | 12,12 | 8,01 | 8,00 | 5,10 | |
| 35-39 | 19 612 | 171 315 | 67 955 | 23 721 | 2 608 | 285 211 |
| | 0,80 | 6,96 | 2,76 | 0,96 | 0,11 | 11,59 |
| | 6,88 | 60,07 | 23,83 | 8,32 | 0,91 | |
| | 9,03 | 12,94 | 11,32 | 9,43 | 3,82 | |
| 40-44 | 14 439 | 127 259 | 63 937 | 28 615 | 2 369 | 236 619 |
| | 0,59 | 5,17 | 2,60 | 1,16 | 0,10 | 9,61 |
| | 6,10 | 53,78 | 27,02 | 12,09 | 1,00 | |
| | 6,65 | 9,62 | 10,65 | 11,38 | 3,47 | |
| 45-49 | 6 921 | 95 857 | 65 699 | 25 397 | 3 486 | 197 360 |
| | 0,28 | 3,90 | 2,67 | 1,03 | 0,14 | 8,02 |
| | 3,51 | 48,57 | 33,29 | 12,87 | 1,77 | |
| | 3,19 | 7,24 | 10,94 | 10,10 | 5,10 | |
| 50-54 | 9 671 | 67 528 | 46 729 | 24 068 | 3 333 | 151 330 |
| | 0,39 | 2,74 | 1,90 | 0,98 | 0,14 | 6,15 |
| | 6,39 | 44,62 | 30,88 | 15,90 | 2,20 | |
| | 4,45 | 5,10 | 7,78 | 9,57 | 4,88 | |
| 55-59 | 6 820 | 56 088 | 59 628 | 30 699 | 5 031 | 158 265 |
| | 0,28 | 2,28 | 2,42 | 1,25 | 0,20 | 6,43 |
| | 4,31 | 35,44 | 37,68 | 19,40 | 3,18 | |
| | 3,14 | 4,24 | 9,93 | 12,21 | 7,36 | |
| 60-64 | 3 364 | 52 000 | 43 542 | 32 381 | 2 131 | 133 418 |
| | 0,14 | 2,11 | 1,77 | 1,32 | 0,09 | 5,42 |
| | 2,52 | 38,98 | 32,64 | 24,27 | 1,60 | |
| | 1,55 | 3,93 | 7,25 | 12,88 | 3,12 | |
| 65-69 | 6 117 | 48 980 | 47 623 | 16 456 | 8 243 | 127 418 |
| | 0,25 | 1,99 | 1,94 | 0,67 | 0,33 | 5,18 |
| | 4,80 | 38,44 | 37,38 | 12,91 | 6,47 | |
| | 2,82 | 3,70 | 7,93 | 6,54 | 12,06 | |

Tableau 31b (suite)

Répartition de l'indice pondéral*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, chez les femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Poids insuffisant | Poids normal | Excès de poids | Obésité | Autres | Total |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 70-74 | 6 620 | 26 595 | 24 973 | 11 484 | 6 820 | 76 491 |
| | 0,27 | 1,08 | 1,01 | 0,47 | 0,28 | 3,11 |
| | 8,65 | 34,77 | 32,65 | 15,01 | 8,92 | |
| | 3,05 | 2,01 | 4,16 | 4,57 | 9,98 | |
| 75-79 | 4 629 | 19 896 | 12 722 | 5 032 | 8 316 | 50 595 |
| | 0,19 | 0,81 | 0,52 | 0,20 | 0,34 | 2,06 |
| | 9,15 | 39,32 | 25,14 | 9,95 | 16,44 | |
| | 2,13 | 1,50 | 2,12 | 2,00 | 12,17 | |
| 80-84 | 1 137 | 10 234 | 7 385 | 3 446 | 3 191 | 25 392 |
| | 0,05 | 0,42 | 0,30 | 0,14 | 0,13 | 1,03 |
| | 4,48 | 40,30 | 29,08 | 13,57 | 12,57 | |
| | 0,52 | 0,77 | 1,23 | 1,37 | 4,67 | |
| 85-89 | 1 199 | 5 677 | 2 856 | 349 | 586 | 10 667 |
| | 0,05 | 0,23 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,43 |
| | 11,24 | 53,22 | 26,77 | 3,27 | 5,49 | |
| | 0,55 | 0,43 | 0,48 | 0,14 | 0,86 | |
| 90-94 | 476 | 366 | 0 | 0 | 0 | 842 |
| | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 56,51 | 43,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,22 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 et + | 820 | 897 | 0 | 0 | 0 | 1 716 |
| | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| | 47,75 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,38 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 217 241 | 1 323 485 | 600 445 | 251 472 | 68 351 | 2 460 994 |
| | 8,83 | 53,78 | 24,40 | 10,22 | 2,78 | 100,00 |

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

1.8

Indice de saines
habitudes
de vie

Tableau 32

Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Indice de saines habitudes de vie | | | | Population estimée |
|-------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------|--------------------------------|
| | Score élevé | Score moyen | Score faible | Inconnu | |
| 15-19 | 291 774 | 108 277 | 34 471 | 52 209 | 486 730 9,52 |
| | 5,71 | 2,12 | 0,67 | 1,02 | |
| | 59,95 | 22,25 | 7,08 | 10,73 | |
| | 11,94 | 7,46 | 4,76 | 10,63 | |
| 20-24 | 290 309 | 141 278 | 61 355 | 36 263 | 529 205 10,36 |
| | 5,68 | 2,76 | 1,20 | 0,71 | |
| | 54,86 | 26,70 | 11,59 | 6,85 | |
| | 11,88 | 9,74 | 8,47 | 7,39 | |
| 25-29 | 299 426 | 177 606 | 75 266 | 29 321 | 581 618 11,38 |
| | 5,86 | 3,48 | 1,47 | 0,57 | |
| | 51,48 | 30,54 | 12,94 | 5,04 | |
| | 12,25 | 12,24 | 10,39 | 5,97 | |
| 30-34 | 276 965 | 181 293 | 79 590 | 28 882 | 566 730 11,09 |
| | 5,42 | 3,55 | 1,56 | 0,57 | |
| | 48,87 | 31,99 | 14,04 | 5,10 | |
| | 11,33 | 12,50 | 10,99 | 5,88 | |
| 35-39 | 283 846 | 176 213 | 81 774 | 26 822 | 568 654 11,13 |
| | 5,55 | 3,45 | 1,60 | 0,52 | |
| | 49,92 | 30,99 | 14,38 | 4,72 | |
| | 11,61 | 12,15 | 11,29 | 5,46 | |
| 40-44 | 221 821 | 144 068 | 80 607 | 31 216 | 477 711 9,35 |
| | 4,34 | 2,82 | 1,58 | 0,61 | |
| | 46,43 | 30,16 | 16,87 | 6,53 | |
| | 9,07 | 9,93 | 11,13 | 6,36 | |
| 45-49 | 192 405 | 104 964 | 59 721 | 28 671 | 385 760 7,55 |
| | 3,76 | 2,05 | 1,17 | 0,56 | |
| | 49,88 | 27,21 | 15,48 | 7,43 | |
| | 7,87 | 7,24 | 8,25 | 5,84 | |
| 50-54 | 125 665 | 85 868 | 56 822 | 33 989 | 302 344 5,92 |
| | 2,46 | 1,68 | 1,11 | 0,67 | |
| | 41,56 | 28,40 | 18,79 | 11,24 | |
| | 5,14 | 5,92 | 7,85 | 6,92 | |
| 55-59 | 122 579 | 96 074 | 54 208 | 47 616 | 320 476 6,27 |
| | 2,40 | 1,88 | 1,06 | 0,93 | |
| | 38,25 | 29,98 | 16,91 | 14,86 | |
| | 5,01 | 6,62 | 7,48 | 9,70 | |
| 60-64 | 105 910 | 85 532 | 52 595 | 42 584 | 286 620 5,61 |
| | 2,07 | 1,67 | 1,03 | 0,83 | |
| | 36,95 | 29,84 | 18,35 | 14,86 | |
| | 4,33 | 5,90 | 7,26 | 8,67 | |
| 65-69 | 108 009 | 64 636 | 37 273 | 43 142 | 253 059 4,95 |
| | 2,11 | 1,26 | 0,73 | 0,84 | |
| | 42,68 | 25,54 | 14,73 | 17,05 | |
| | 4,42 | 4,46 | 5,15 | 8,79 | |

Tableau 32 (suite)

Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Indice de saines habitudes de vie | | | | Population estimée |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | Score élevé | Score moyen | Score faible | Inconnu | |
| 70-74 | 66 386 | 38 102 | 25 820 | 35 369 | 165 677 3,24 |
| | 1,30 | 0,75 | 0,51 | 0,69 | |
| | 40,07 | 23,00 | 15,58 | 21,35 | |
| | 2,72 | 2,63 | 3,56 | 7,20 | |
| 75-79 | 34 290 | 27 121 | 12 675 | 32 682 | 106 769 2,09 |
| | 0,67 | 0,53 | 0,25 | 0,64 | |
| | 32,12 | 25,40 | 11,87 | 30,61 | |
| | 1,40 | 1,87 | 1,75 | 6,66 | |
| 80-84 | 21 578 | 11 340 | 8 591 | 16 784 | 58 292 1,14 |
| | 0,42 | 0,22 | 0,17 | 0,33 | |
| | 37,02 | 19,45 | 14,74 | 28,79 | |
| | 0,88 | 0,78 | 1,19 | 3,42 | |
| 85-89 | 2 592 | 6 510 | 3 507 | 2 826 | 15 435 0,30 |
| | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | |
| | 16,79 | 42,18 | 22,72 | 18,31 | |
| | 0,11 | 0,45 | 0,48 | 0,58 | |
| 90-94 | 0 | 710 | 0 | 1 032 | 1 742 0,03 |
| | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | |
| | 0,00 | 40,76 | 0,00 | 59,24 | |
| | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,21 | |
| 95 et + | 929 | 1 025 | 0 | 1 591 | 3 544 0,07 |
| | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | |
| | 26,20 | 28,91 | 0,00 | 44,89 | |
| | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,32 | |
| Total | 2 444 481 47,83 | 1 450 616 28,39 | 724 274 14,17 | 490 996 9,61 | 5 110 367 100,00 |

Légende:

population estimée

pourcentage sur le total

pourcentage sur la ligne

pourcentage sur la colonne

Tableau 33
Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, hommes âgés de 15 ans et plus,
 Québec, 1987

| Âge | Indice de saines habitudes de vie | | | | Population estimée |
|-------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------|
| | Score élevé | Score moyen | Score faible | Inconnu | |
| 15-19 | 137 929 | 61 513 | 18 514 | 29 721 | 247 677 9,99 |
| | 5,56 | 2,48 | 0,75 | 1,20 | |
| | 55,69 | 24,84 | 7,48 | 12,00 | |
| | 12,44 | 8,57 | 4,48 | 12,41 | |
| 20-24 | 144 988 | 68 272 | 32 616 | 20 041 | 265 917 10,73 |
| | 5,85 | 2,75 | 1,32 | 0,81 | |
| | 54,52 | 25,67 | 12,27 | 7,54 | |
| | 13,08 | 9,51 | 7,89 | 8,36 | |
| 25-29 | 142 867 | 81 811 | 38 561 | 18 387 | 281 625 11,36 |
| | 5,76 | 3,30 | 1,56 | 0,74 | |
| | 50,73 | 29,05 | 13,69 | 6,53 | |
| | 12,89 | 11,40 | 9,33 | 7,67 | |
| 30-34 | 133 712 | 88 968 | 49 159 | 16 136 | 287 975 11,61 |
| | 5,39 | 3,59 | 1,98 | 0,65 | |
| | 46,43 | 30,89 | 17,07 | 5,60 | |
| | 12,06 | 12,40 | 11,89 | 6,73 | |
| 35-39 | 126 403 | 90 815 | 48 616 | 12 144 | 277 977 11,21 |
| | 5,10 | 3,66 | 1,96 | 0,49 | |
| | 45,47 | 32,67 | 17,49 | 4,37 | |
| | 11,40 | 12,65 | 11,76 | 5,07 | |
| 40-44 | 102 830 | 68 514 | 50 507 | 17 180 | 239 031 9,64 |
| | 4,15 | 2,76 | 2,04 | 0,69 | |
| | 43,02 | 28,66 | 21,13 | 7,19 | |
| | 9,27 | 9,55 | 12,22 | 7,17 | |
| 45-49 | 81 623 | 55 440 | 33 214 | 14 484 | 184 762 7,45 |
| | 3,29 | 2,24 | 1,34 | 0,58 | |
| | 44,18 | 30,01 | 17,98 | 7,84 | |
| | 7,36 | 7,72 | 8,04 | 6,05 | |
| 50-54 | 56 515 | 43 431 | 33 719 | 13 281 | 146 946 5,93 |
| | 2,28 | 1,75 | 1,36 | 0,54 | |
| | 38,46 | 29,56 | 22,95 | 9,04 | |
| | 5,10 | 6,05 | 8,16 | 5,54 | |
| 55-59 | 48 229 | 51 276 | 28 161 | 22 106 | 149 773 6,04 |
| | 1,95 | 2,07 | 1,14 | 0,89 | |
| | 32,20 | 34,24 | 18,80 | 14,76 | |
| | 4,35 | 7,14 | 6,81 | 9,23 | |
| 60-64 | 44 774 | 44 948 | 28 419 | 26 296 | 144 436 5,83 |
| | 1,81 | 1,81 | 1,15 | 1,06 | |
| | 31,00 | 31,12 | 19,68 | 18,21 | |
| | 4,04 | 6,26 | 6,88 | 10,98 | |
| 65-69 | 43 039 | 24 565 | 21 257 | 15 374 | 104 234 4,20 |
| | 1,74 | 0,99 | 0,86 | 0,62 | |
| | 41,29 | 23,57 | 20,39 | 14,75 | |
| | 3,88 | 3,42 | 5,14 | 6,42 | |

Tableau 33 (suite)

Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, hommes âgés de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Indice de saines habitudes de vie | | | | Population estimée |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | Score élevé | Score moyen | Score faible | Inconnu | |
| 70-74 | 24 672 | 19 395 | 15 539 | 12 851 | 72 456 |
| | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,52 | 2,92 |
| | 34,05 | 26,77 | 21,45 | 17,74 | |
| | 2,23 | 2,70 | 3,76 | 5,36 | |
| 75-79 | 11 248 | 14 829 | 7 765 | 11 569 | 45 410 |
| | 0,45 | 0,60 | 0,31 | 0,47 | 1,83 |
| | 24,77 | 32,66 | 17,10 | 25,48 | |
| | 1,01 | 2,07 | 1,88 | 4,83 | |
| 80-84 | 8 408 | 3 915 | 5 376 | 7 354 | 25 053 |
| | 0,34 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 1,01 |
| | 33,56 | 15,63 | 21,46 | 29,35 | |
| | 0,76 | 0,55 | 1,30 | 3,07 | |
| 85-89 | 743 | 76 | 1 872 | 1 749 | 4 440 |
| | 0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,18 |
| | 16,73 | 1,71 | 42,16 | 39,40 | |
| | 0,07 | 0,01 | 0,45 | 0,73 | |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 541 | 541 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | |
| 95 et + | 781 | 0 | 0 | 368 | 1 150 |
| | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| | 67,95 | 0,00 | 0,00 | 32,05 | |
| | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| Total | 1 108 760 | 717 767 | 413 293 | 239 582 | 2 479 402 |
| | 44,72 | 28,95 | 16,67 | 9,66 | 100,00 |

Légende:

population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 34

Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Indice de saines habitudes de vie | | | | Population estimée |
|-------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------|--------------------------------|
| | Score élevé | Score moyen | Score faible | Inconnu | |
| 15-19 | 153 845 | 46 764 | 15 957 | 22 488 | 239 054 9,09 |
| | 5,85 | 1,78 | 0,61 | 0,85 | |
| | 64,36 | 19,56 | 6,68 | 9,41 | |
| | 11,52 | 6,38 | 5,13 | 8,94 | |
| 20-24 | 145 320 | 73 006 | 28 740 | 16 222 | 263 288 10,01 |
| | 5,52 | 2,77 | 1,09 | 0,62 | |
| | 55,19 | 27,73 | 10,92 | 6,16 | |
| | 10,88 | 9,96 | 9,24 | 6,45 | |
| 25-29 | 156 559 | 95 795 | 36 705 | 10 934 | 299 993 11,40 |
| | 5,95 | 3,64 | 1,40 | 0,42 | |
| | 52,19 | 31,93 | 12,24 | 3,64 | |
| | 11,72 | 13,07 | 11,80 | 4,35 | |
| 30-34 | 143 253 | 92 325 | 30 431 | 12 746 | 278 755 10,60 |
| | 5,44 | 3,51 | 1,16 | 0,48 | |
| | 51,39 | 33,12 | 10,92 | 4,57 | |
| | 10,72 | 12,60 | 9,79 | 5,07 | |
| 35-39 | 157 443 | 85 399 | 33 158 | 14 678 | 290 677 11,05 |
| | 5,98 | 3,25 | 1,26 | 0,56 | |
| | 54,16 | 29,38 | 11,41 | 5,05 | |
| | 11,79 | 11,65 | 10,66 | 5,84 | |
| 40-44 | 118 990 | 75 554 | 30 101 | 14 035 | 238 680 9,07 |
| | 4,52 | 2,87 | 1,14 | 0,53 | |
| | 49,85 | 31,65 | 12,61 | 5,88 | |
| | 8,91 | 10,31 | 9,68 | 5,58 | |
| 45-49 | 110 782 | 45 524 | 26 507 | 14 187 | 200 999 7,64 |
| | 4,21 | 1,88 | 1,01 | 0,54 | |
| | 55,12 | 24,64 | 13,19 | 7,06 | |
| | 8,29 | 6,76 | 8,52 | 5,64 | |
| 50-54 | 69 150 | 42 438 | 23 103 | 20 708 | 155 398 5,91 |
| | 2,63 | 1,61 | 0,88 | 0,79 | |
| | 44,50 | 27,31 | 14,87 | 13,33 | |
| | 5,18 | 5,79 | 7,43 | 8,24 | |
| 55-59 | 74 350 | 44 798 | 26 047 | 25 510 | 170 704 6,49 |
| | 2,83 | 1,70 | 0,99 | 0,97 | |
| | 43,55 | 26,24 | 15,26 | 14,94 | |
| | 5,57 | 6,11 | 8,38 | 10,15 | |
| 60-64 | 61 136 | 40 584 | 24 176 | 16 288 | 142 184 5,40 |
| | 2,32 | 1,54 | 0,92 | 0,62 | |
| | 43,00 | 28,54 | 17,00 | 11,46 | |
| | 4,58 | 5,54 | 7,77 | 6,48 | |
| 65-69 | 64 970 | 40 071 | 16 016 | 27 768 | 148 825 5,66 |
| | 2,47 | 1,52 | 0,61 | 1,06 | |
| | 43,66 | 26,93 | 10,76 | 18,66 | |
| | 4,86 | 5,47 | 5,15 | 11,04 | |

Tableau 34 (suite)

Indice de saines habitudes de vie*, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Indice de saines habitudes de vie | | | | Population estimée |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | Score élevé | Score moyen | Score faible | Inconnu | |
| 70-74 | 41 714 | 18 707 | 10 281 | 22 519 | 93 221 |
| | 1,59 | 0,71 | 0,39 | 0,86 | 3,54 |
| | 44,75 | 20,07 | 11,03 | 24,16 | |
| | 3,12 | 2,55 | 3,31 | 8,96 | |
| 75-79 | 23 043 | 12 292 | 4 911 | 21 113 | 61 359 |
| | 0,88 | 0,47 | 0,19 | 0,80 | 2,33 |
| | 37,55 | 20,03 | 8,00 | 34,41 | |
| | 1,73 | 1,63 | 1,58 | 8,40 | |
| 80-84 | 13 169 | 7 425 | 3 215 | 9 430 | 33 239 |
| | 0,50 | 0,28 | 0,12 | 0,36 | 1,26 |
| | 39,62 | 22,34 | 9,67 | 28,37 | |
| | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 3,75 | |
| 85-89 | 1 849 | 6 434 | 1 636 | 1 077 | 10 995 |
| | 0,07 | 0,24 | 0,06 | 0,04 | 0,42 |
| | 16,82 | 58,52 | 14,88 | 9,79 | |
| | 0,14 | 0,88 | 0,53 | 0,43 | |
| 90-94 | 0 | 710 | 0 | 490 | 1 200 |
| | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
| | 0,00 | 59,15 | 0,00 | 40,85 | |
| | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | |
| 95 et + | 147 | 1 025 | 0 | 1 223 | 2 395 |
| | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,09 |
| | 6,15 | 42,79 | 0,00 | 51,05 | |
| | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,49 | |
| Total | 1 335 720 | 732 849 | 310 981 | 251 415 | 2 630 965 |
| | 50,77 | 27,85 | 11,82 | 9,56 | 100,00 |

Légende:

population estimée
pourcentage sur le total
pourcentage sur la ligne
pourcentage sur la colonne

Tableau 35

Indice de saines habitudes de vie*, selon le niveau de revenu*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de revenu | Indice de saines habitudes de vie | | | Population estimée |
|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | Score élevé | Score moyen | Score faible | |
| Total | 52,1 | 32,1 | 15,8 | 3 965 047 |
| Très pauvre | 41,7 | 36,3 | 22,0 | 292 867 |
| Pauvre | 46,4 | 34,8 | 18,8 | 555 441 |
| À revenu moyen | 52,0 | 32,7 | 15,3 | 2 213 406 |
| Riche | 59,2 | 27,4 | 13,4 | 903 334 |

Tableau 36

Indice de saines habitudes de vie*, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Scolarité | Indice de saines habitudes de vie | | | Population estimée |
|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | Score élevé | Score moyen | Score faible | |
| Total | 52,0 | 31,8 | 16,2 | 4 310 510 |
| Quintile 1 | 39,5 | 37,5 | 23,0 | 697 524 |
| Quintile 2 | 46,1 | 35,2 | 18,7 | 758 165 |
| Quintile 3 | 50,6 | 32,5 | 16,9 | 811 991 |
| Quintile 4 | 54,4 | 31,5 | 14,1 | 970 489 |
| Quintile 5 | 63,2 | 25,4 | 11,4 | 1 072 341 |

Tableau 37

Indice de saines habitudes de vie*, selon la catégorie professionnelle, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Catégorie professionnelle | Indice des saines habitudes de vie | | | Population estimée |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | Score élevé | Score moyen | Score faible | |
| Total | 53,2 | 31,7 | 15,1 | 2 591 376 |
| Col blanc/ direction | 60,4 | 23,4 | 11,2 | 766 951 |
| Col blanc/ administration | 54,9 | 31,6 | 13,5 | 772 237 |
| Col bleu/ primaire | 50,1 | 33,9 | 16,0 | 66 670 |
| Col bleu/ secondaire | 45,6 | 34,5 | 19,9 | 446 817 |
| Col bleu/ tertiaire | 47,3 | 34,1 | 18,6 | 538 702 |

Chapitre 2

Comportements préventifs

2.1

Comportements reliés aux véhicules moteurs

Tableau 38
Port de la ceinture de sécurité, selon l'âge et le sexe, population âgée
de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Total | | Hommes | | Femmes | |
|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | N | % | N | % | N | % |
| 15-17 | 274 997 | 91,0 | 126 559 | 89,3 | 123 918 | 92,9 |
| 18-19 | 171 449 | 90,8 | 78 295 | 91,2 | 77 510 | 90,5 |
| 20-24 | 505 272 | 90,1 | 221 068 | 87,0 | 234 468 | 93,3 |
| 25-29 | 560 721 | 88,9 | 229 351 | 84,3 | 269 518 | 93,3 |
| 30-34 | 541 345 | 89,2 | 235 256 | 85,3 | 248 127 | 93,4 |
| 35-39 | 537 294 | 92,1 | 236 270 | 89,9 | 259 054 | 94,3 |
| 40-44 | 453 249 | 91,8 | 106 061 | 89,4 | 210 081 | 94,3 |
| 45-49 | 363 062 | 89,5 | 149 671 | 85,5 | 175 618 | 93,4 |
| 50-54 | 276 178 | 92,6 | 124 349 | 90,8 | 131 642 | 94,5 |
| 55-59 | 285 764 | 93,8 | 119 884 | 90,0 | 148 181 | 97,1 |
| 60-64 | 254 050 | 96,2 | 123 007 | 94,8 | 121 474 | 97,7 |
| 65-69 | 211 874 | 92,7 | 85 936 | 91,7 | 110 538 | 93,5 |
| 70-74 | 128 492 | 91,1 | 58 075 | 92,7 | 59 075 | 89,7 |
| 75 et + | 130 822 | 91,8 | 52 726 | 91,2 | 67 431 | 92,3 |
| Total | 4 694 568 | 91,2 | 2 046 508 | 88,5 | 2 236 634 | 93,8 |
| 15-24 | 951 718 | 90,5 | 425 922 | 88,4 | 435 896 | 92,7 |
| 25-44 | 2 092 609 | 90,4 | 906 938 | 87,1 | 986 780 | 93,8 |
| 45-64 | 1 179 053 | 92,7 | 516 911 | 89,9 | 576 915 | 95,5 |
| 65 et + | 471 188 | 92,0 | 196 737 | 91,8 | 237 044 | 92,2 |

N = population estimée

Tableau 39
Port de la ceinture de sécurité, selon le statut, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Statut/âge | Total | | Hommes | Femmes |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | N | % | % | % |
| Conducteur | | | | |
| 15-24 | 326 082 | 88,2 | 85,9 | 93,9 |
| 25-44 | 1 273 180 | 88,7 | 86,4 | 93,9 |
| 45-64 | 692 725 | 90,6 | 89,7 | 93,3 |
| 65 et + | 183 372 | 92,7 | 92,3 | 95,4 |
| Total | 2 475 358 | 89,5 | 87,8 | 93,8 |
| Passager | | | | |
| 15-24 | 447 632 | 91,5 | 90,2 | 92,4 |
| 25-44 | 440 774 | 92,0 | 93,1 | 91,7 |
| 45-64 | 350 843 | 95,3 | 90,4 | 96,0 |
| 65 et + | 256 362 | 91,0 | 89,0 | 91,4 |
| Total | 1 495 611 | 92,5 | 90,8 | 93,0 |
| Cond./pass. | | | | |
| 15-24 | 178 110 | 92,1 | 91,8 | 92,4 |
| 25-44 | 378 505 | 94,4 | 87,4 | 96,1 |
| 45-64 | 135 434 | 96,6 | 92,9 | 97,3 |
| 65 et + | 31 483 | 96,1 | 95,2 | 96,9 |
| Total | 723 533 | 94,4 | 90,4 | 95,6 |

N = population estimée

Tableau 40
**Port de la ceinture de sécurité en automobile, selon la scolarité*,
 population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987**

| Scolarité | Port | Non-port | Total |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Quintile 1 | 683 738 | 85 575 | 769 314 |
| | 14,76 | 1,85 | 16,61 |
| | 88,88 | 11,12 | |
| | 16,17 | 21,19 | |
| Quintile 2 | 765 327 | 88 186 | 853 513 |
| | 16,52 | 1,90 | 18,42 |
| | 89,67 | 10,33 | |
| | 18,10 | 21,83 | |
| Quintile 3 | 811 447 | 77 768 | 889 215 |
| | 17,52 | 1,68 | 19,19 |
| | 91,25 | 8,75 | |
| | 19,19 | 19,25 | |
| Quintile 4 | 932 965 | 84 878 | 1 017 843 |
| | 20,14 | 1,83 | 21,97 |
| | 91,66 | 8,34 | |
| | 22,06 | 21,01 | |
| Quintile 5 | 1 035 381 | 67 501 | 1 102 881 |
| | 22,35 | 1,46 | 23,81 |
| | 93,88 | 6,12 | |
| | 24,48 | 16,71 | |
| Total | 4 228 857 | 403 908 | 4 632 766 |
| | 91,28 | 8,72 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 126 859

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 41

Répartition des utilisateurs d'automobile, selon le statut des personnes, le nombre de kilomètres parcourus, le sexe et le port de la ceinture de sécurité, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Statut/Kilomètres/Sexe | | Port de la ceinture | Non-port de la ceinture | Total |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------|
| Conducteur | | | | |
| - 5 000 km | H | 86,5 | 13,5 | 100,0 |
| | F | 93,3 | 6,7 | 100,0 |
| 5 000 km et + | H | 87,9 | 12,1 | 100,0 |
| | F | 94,0 | 6,0 | 100,0 |
| Passager | | | | |
| - 5 000 km | H | 91,3 | 8,7 | 100,0 |
| | F | 92,4 | 7,6 | 100,0 |
| 5 000 km et + | H | 88,5 | 11,5 | 100,0 |
| | F | 94,1 | 5,9 | 100,0 |
| Conducteur et passager | | | | |
| - 5 000 km | H | 89,2 | 10,8 | 100,0 |
| | F | 96,4 | 3,6 | 100,0 |
| 5 000 km et + | H | 89,2 | 10,7 | 100,0 |
| | F | 95,6 | 4,4 | 100,0 |

Tableau 42

Port du casque de sécurité en motocyclette, selon l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Port | Non-port | Population estimée |
|--------------|-------------|------------|--------------------|
| 15-24 | 92,1 | 7,9 | 218 397 |
| 25-44 | 95,3 | 4,7 | 215 614 |
| 45-64 | 91,3 | 8,7 | 30 282 |
| 65 et + | 87,0 | 13,0 | 2 904 |
| Total | 93,5 | 6,5 | 467 197 |

Tableau 43

Répartition des utilisateurs de véhicule tout terrain, selon qu'ils portent ou non le casque de sécurité, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Port | Non-port | Total |
|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| 15-24 | H | 57,1 | 42,9 | 100,0 |
| | F | 45,9 | 44,9 | 100,0 |
| 25-44 | H | 47,5 | 52,5 | 100,0 |
| | F | 41,1 | 58,9 | 100,0 |
| 45-64 | H | 60,1 | 39,9 | 100,0 |
| | F | 47,5 | 52,5 | 100,0 |
| 65 et + | H | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| | F | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Total | H | 53,2 | 46,8 | 100,0 |
| | F | 44,3 | 55,7 | 100,0 |

Tableau 44
**Port du casque de sécurité en véhicule tout terrain, selon l'âge,
 en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987**

| Âge | Port | Non-port | Total |
|-------|--------|----------|---------------|
| 15-17 | 52 550 | 36 892 | 89 442 |
| | 10,64 | 7,47 | 18,12 |
| | 58,75 | 41,25 | |
| | 21,24 | 14,98 | |
| 18-19 | 20 482 | 21 596 | 42 078 |
| | 4,15 | 4,37 | 8,52 |
| | 48,68 | 51,32 | |
| | 8,28 | 8,77 | |
| 20-24 | 38 105 | 41 890 | 79 995 |
| | 7,72 | 8,49 | 16,20 |
| | 47,63 | 52,37 | |
| | 15,40 | 17,01 | |
| 25-29 | 27 920 | 39 413 | 67 332 |
| | 5,66 | 7,98 | 13,64 |
| | 41,47 | 58,53 | |
| | 11,28 | 16,00 | |
| 30-34 | 31 766 | 34 180 | 65 945 |
| | 6,43 | 6,92 | 13,36 |
| | 48,17 | 51,83 | |
| | 12,84 | 13,88 | |
| 35-39 | 15 530 | 25 321 | 40 851 |
| | 3,15 | 5,13 | 8,27 |
| | 38,02 | 61,98 | |
| | 6,28 | 10,28 | |
| 40-44 | 20 581 | 16 081 | 36 663 |
| | 4,17 | 3,26 | 7,43 |
| | 56,14 | 43,86 | |
| | 8,32 | 6,53 | |
| 45-49 | 12 431 | 11 392 | 23 822 |
| | 2,52 | 2,31 | 4,83 |
| | 52,18 | 47,82 | |
| | 5,02 | 4,63 | |
| 50-54 | 8 691 | 8 437 | 17 127 |
| | 1,76 | 1,71 | 3,47 |
| | 50,74 | 49,26 | |
| | 3,51 | 3,43 | |
| 55-59 | 6 694 | 4 807 | 11 501 |
| | 1,36 | 0,97 | 2,33 |
| | 58,21 | 41,79 | |
| | 2,71 | 1,95 | |
| 60-64 | 7 580 | 2 138 | 9 717 |
| | 1,54 | 0,43 | 1,97 |
| | 78,00 | 22,00 | |
| | 3,06 | 0,87 | |

Tableau 44 (suite)
**Port du casque de sécurité en véhicule tout terrain, selon l'âge,
 en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987**

| Âge | Port | Non-port | Total |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 65-69 | 3 678 | 2 246 | 5 923 |
| | 0,74 | 0,45 | 1,20 |
| | 62,08 | 37,92 | |
| | 1,49 | 0,91 | |
| 70-74 | 943 | 1 277 | 2 220 |
| | 0,19 | 0,26 | 0,45 |
| | 42,46 | 57,54 | |
| | 0,38 | 0,52 | |
| 75 et + | 470 | 603 | 1 073 |
| | 0,10 | 0,12 | 0,22 |
| | 43,84 | 56,16 | |
| | 0,19 | 0,24 | |
| Total | 247 419 | 246 271 | 493 690 |
| | 50,12 | 49,88 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 7 789

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 45
**Port de la ceinture de sécurité en automobile, selon le type de buveurs
 et la consommation hebdomadaire, population âgée de 15 ans et plus,
 Québec, 1987**

| Type de buveurs | Hommes % | Femmes % | Total % | Population estimée |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Abstinent | 92,6 | 94,1 | 93,6 | 600 544 |
| Ancien | 86,0 | 91,5 | 88,4 | 244 077 |
| Occasionnel | 90,6 | 95,1 | 93,5 | 917 382 |
| Habituel | 87,8 | 93,5 | 90,2 | 2 871 658 |
| 0-6 cons./sem. | 89,6 | 93,7 | 91,7 | 1 965 000 |
| 7-13 cons./sem. | 87,3 | 94,4 | 89,5 | 477 229 |
| 14 et + cons./sem. | 81,6 | 86,4 | 82,4 | 340 581 |
| Total | 88,5 | 93,9 | 91,2 | 4 633 660 |

2.2

Comportements
spécifiques
aux femmes

Tableau 46

Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin (test de Pap), selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec 1987

| Âge/Scolarité | | Délai depuis le dernier test de Pap | | | | Total |
|------------------|---|-------------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------|
| | | 12 mois et - | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | |
| Total | N | 1 164 820 | 432 404 | 457 274 | 358 321 | 2 412 818 |
| | % | 48,3 | 17,9 | 19,0 | 14,8 | 100,0 |
| Âge | | | | | | |
| 15-24 | N | 244 794 | 45 023 | 14 843 | 170 268 | 474 927 |
| | % | 51,5 | 9,5 | 3,1 | 35,9 | 100,0 |
| 25-44 | N | 623 967 | 229 185 | 166 336 | 52 539 | 1 072 027 |
| | % | 58,2 | 21,4 | 15,5 | 4,9 | 100,0 |
| 45-64 | N | 251 540 | 126 303 | 180 881 | 50 838 | 609 562 |
| | % | 41,3 | 20,7 | 29,7 | 8,3 | 100,0 |
| 65 et + | N | 44 519 | 31 893 | 95 215 | 84 676 | 256 302 |
| | % | 17,4 | 12,4 | 37,2 | 33,0 | 100,0 |
| Scolarité | | | | | | |
| Quintile 1 | N | 182 697 | 78 201 | 94 825 | 88 893 | 444 617 |
| | % | 41,1 | 17,6 | 21,3 | 20,0 | 100,0 |
| Quintile 2 | N | 195 328 | 71 939 | 73 949 | 78 330 | 419 545 |
| | % | 46,6 | 17,1 | 17,6 | 18,7 | 100,0 |
| Quintile 3 | N | 232 218 | 94 257 | 94 293 | 67 728 | 488 497 |
| | % | 47,5 | 19,3 | 19,3 | 13,9 | 100,0 |
| Quintile 4 | N | 282 186 | 95 659 | 101 636 | 41 327 | 520 808 |
| | % | 54,2 | 18,4 | 19,5 | 7,9 | 100,0 |
| Quintile 5 | N | 272 391 | 92 347 | 92 571 | 82 043 | 539 352 |
| | % | 50,5 | 17,1 | 17,2 | 15,2 | 100,0 |

Valeurs manquantes: 218 147

N = population estimée

Tableau 47

Fréquence de l'auto-examen des seins, selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge/scolarité | | Fréquence de l'auto-examen des seins | | | | Total |
|------------------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 1 fois/mois | 1 fois/ 2-3 mois | Moins souvent | Jamais | |
| Total | N | 633 970 | 468 290 | 599 502 | 829 314 | 2 531 077 |
| | % | 25,0 | 18,5 | 23,7 | 32,8 | 100,0 |
| Âge | | | | | | |
| 15-24 | N | 88 267 | 71 626 | 107 832 | 222 119 | 489 845 |
| | % | 18,0 | 14,6 | 22,0 | 45,4 | 100,0 |
| 25-44 | N | 263 376 | 224 675 | 293 037 | 309 801 | 1 090 889 |
| | % | 24,1 | 20,6 | 26,9 | 28,4 | 100,0 |
| 45-64 | N | 207 226 | 125 652 | 151 029 | 166 179 | 650 086 |
| | % | 31,9 | 19,3 | 23,2 | 25,6 | 100,0 |
| 65 et + | N | 75 101 | 46 337 | 47 604 | 131 215 | 300 257 |
| | % | 25,0 | 15,4 | 15,9 | 43,7 | 100,0 |
| Scolarité | | | | | | |
| Quintile 1 | N | 122 797 | 70 669 | 88 385 | 194 428 | 476 279 |
| | % | 25,8 | 14,8 | 18,6 | 40,8 | 100,0 |
| Quintile 2 | N | 113 820 | 74 805 | 102 348 | 152 034 | 443 007 |
| | % | 25,7 | 16,9 | 23,1 | 34,3 | 100,0 |
| Quintile 3 | N | 131 567 | 94 082 | 116 710 | 172 518 | 514 877 |
| | % | 25,5 | 18,3 | 22,7 | 33,5 | 100,0 |
| Quintile 4 | N | 141 496 | 111 570 | 139 608 | 149 989 | 542 662 |
| | % | 26,1 | 20,6 | 25,7 | 27,6 | 100,0 |
| Quintile 5 | N | 124 291 | 117 164 | 152 451 | 160 344 | 554 252 |
| | % | 22,4 | 21,2 | 27,5 | 28,9 | 100,0 |

Valeurs manquantes: 99 888

N = population estimée

Tableau 48

Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, selon l'âge et la scolarité*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge/Scolarité | | Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel | | | | Total |
|------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 12 mois et - | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | |
| Total | N | 1 199 560 | 441 966 | 424 914 | 404 502 | 2 470 943 |
| | % | 48,5 | 17,9 | 17,2 | 16,4 | 100,0 |
| Âge | | | | | | |
| 15-24 | N | 229 292 | 54 742 | 26 534 | 167 014 | 477 582 |
| | % | 48,0 | 11,4 | 5,6 | 35,0 | 100,0 |
| 25-44 | N | 579 000 | 229 892 | 185 797 | 82 204 | 1 076 893 |
| | % | 53,8 | 21,3 | 17,3 | 7,6 | 100,0 |
| 45-64 | N | 303 583 | 123 257 | 136 545 | 72 761 | 636 146 |
| | % | 47,7 | 19,4 | 21,5 | 11,4 | 100,0 |
| 65 et + | N | 87 685 | 34 075 | 76 039 | 82 524 | 280 322 |
| | % | 31,3 | 12,2 | 27,1 | 29,4 | 100,0 |
| Scolarité | | | | | | |
| Quintile 1 | N | 187 437 | 75 954 | 86 577 | 110 756 | 460 724 |
| | % | 40,7 | 16,5 | 18,8 | 24,0 | 100,0 |
| Quintile 2 | N | 191 944 | 76 975 | 69 238 | 93 809 | 431 965 |
| | % | 44,4 | 17,8 | 16,1 | 21,7 | 100,0 |
| Quintile 3 | N | 242 989 | 94 826 | 86 734 | 77 318 | 501 867 |
| | % | 48,4 | 18,9 | 17,3 | 15,4 | 100,0 |
| Quintile 4 | N | 287 583 | 98 611 | 92 190 | 52 111 | 530 494 |
| | % | 54,2 | 18,6 | 17,4 | 9,8 | 100,0 |
| Quintile 5 | N | 289 607 | 95 601 | 90 176 | 70 508 | 545 893 |
| | % | 53,1 | 17,5 | 16,5 | 12,9 | 100,0 |

Valeurs manquantes = 160 022

N = population estimée

Tableau 49
Délai depuis la dernière mammographie et fréquence de la mammographie, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Délai depuis la dernière mammographie | | | | | Total |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | 12 mois et - | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | | |
| Total | N % | 193 563 7,9 | 148 641 6,0 | 294 733 11,9 | 1 828 497 74,2 | 2 465 436 100,0 |
| 15-29 | N % | 15 396 2,0 | 12 880 1,6 | 16 239 2,1 | 731 608 94,3 | 776 124 100,0 |
| 30-39 | N % | 32 326 5,9 | 27 643 5,0 | 79 565 14,4 | 412 586 74,7 | 552 121 100,0 |
| 40-49 | N % | 55 336 13,2 | 46 756 11,1 | 89 672 21,4 | 227 741 54,3 | 419 506 100,0 |
| 50-59 | N % | 45 005 14,9 | 33 111 11,0 | 51 573 17,1 | 172 365 57,0 | 302 054 100,0 |
| 60-69 | N % | 33 420 13,0 | 22 547 8,7 | 41 235 16,0 | 160 846 62,3 | 258 047 100,0 |
| 70-79 | N % | 10 600 9,0 | 5 375 4,6 | 14 943 12,6 | 87 173 73,8 | 118 089 100,0 |
| 80 et + | N % | 1 482 3,8 | 331 0,8 | 1 506 3,8 | 36 177 91,6 | 39 496 100,0 |

Valeurs manquantes = 165 529

N = population estimée

Tableau 50
Délai depuis la dernière mammographie, selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 50 à 59 ans, Québec, 1987

| Niveau de revenu | Délai depuis la dernière mammographie | | | | | Total |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 12 mois et - | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | | |
| Total | N % | 40 927 15,2 | 29 319 10,9 | 44 594 16,6 | 154 067 57,3 | 268 905 100,0 |
| Très pauvre | N % | 1 765 8,6 | 1 839 9,0 | 2 099 10,3 | 14 725 72,1 | 20 428 100,0 |
| Pauvre | N % | 4 592 12,7 | 3 101 8,6 | 5 353 14,8 | 23 064 63,9 | 36 110 100,0 |
| À revenu moyen | N % | 19 275 13,2 | 17 463 12,0 | 25 425 17,4 | 83 744 57,4 | 145 907 100,0 |
| Riche | N % | 15 295 23,0 | 6 916 10,4 | 11 716 17,6 | 32 534 49,0 | 66 461 100,0 |

Valeurs manquantes = 57 196

N = population estimée

Tableau 51
Consommation de contraceptifs oraux, selon l'âge et le tabagisme, femmes âgées de 15 à 44 ans, Québec, 1987

| Âge/tabagisme | Contraceptifs oraux | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 15-24 | | |
| Total | N % | 241 139 48,9 |
| Jamais fumé | N % | 61 980 33,3 |
| Ex-fumeuses | N % | 48 595 51,4 |
| Fumeuses occasionnelles | N % | 19 177 44,2 |
| Fumeuses régulières | N % | 111 386 65,9 |
| 25-44 | | |
| Total | N % | 197 040 18,0 |
| Jamais fumé | N % | 56 953 17,8 |
| Ex-fumeuses | N % | 49 250 16,2 |
| Fumeuses occasionnelles | N % | 10 132 16,4 |
| Fumeuses régulières | N % | 80 705 19,7 |

Valeurs manquantes = 21 968

Pourcentages calculés sur la base du nombre de femmes dans chaque catégorie de consommation de tabac, selon le groupe d'âge

N = population estimée

Tableau 52
Consommation de contraceptifs oraux, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Consommation de contraceptifs oraux | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | N | % |
| Total | 444 230 | 18,0 |
| 15-24 | 238 807 | 48,8 |
| 25-44 | 196 347 | 18,0 |
| 45-64 | 6 224 | 1,0 |
| 65 et + | 2 852 | 1,0 |

Valeurs manquantes = 164 094

Pourcentages calculés sur la base du nombre de femmes dans chaque groupe d'âge

N = population estimée

Tableau 53
Consommation de médicaments à teneur hormonale pour problèmes reliés à la ménopause, selon l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Consommation de médicaments à teneur hormonale | |
|--------------|--|------------|
| | N | % |
| Total | 191 146 | 8,1 |
| 15-24 | 686 | 0,2 |
| 25-44 | 30 211 | 2,9 |
| 45-64 | 140 981 | 22,4 |
| 65 et + | 19 268 | 7,1 |

Valeurs manquantes = 272 576

Pourcentages calculés sur la base du nombre de femmes dans chaque groupe d'âge

N = population estimée

Tableau 54
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de revenu | Délai depuis le dernier test de Pap | | | | | Total |
|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 12 mois et – | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | |
| Total | N | 1 075 577 | 395 680 | 423 630 | 315 941 | 2 210 828 |
| | % | 48,6 | 17,9 | 19,2 | 14,3 | 100,0 |
| Très pauvre | N | 70 327 | 37 287 | 37 336 | 36 411 | 181 361 |
| | % | 38,8 | 20,5 | 20,6 | 20,1 | 100,0 |
| Pauvre | N | 142 865 | 52 803 | 80 849 | 70 540 | 347 056 |
| | % | 41,2 | 15,2 | 23,3 | 20,3 | 100,0 |
| À revenu moyen | N | 612 268 | 211 874 | 229 647 | 147 216 | 1 201 005 |
| | % | 51,0 | 17,6 | 19,1 | 12,3 | 100,0 |
| Riche | N | 250 118 | 93 716 | 75 799 | 61 774 | 481 407 |
| | % | 52,0 | 19,5 | 15,7 | 12,8 | 100,0 |

Valeurs manquantes: 420 137

N = population estimée

Tableau 55
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon la consommation de contraceptifs oraux et l'âge, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Consommation de contraceptifs oraux | Délai depuis le dernier test de Pap | | | | | Total |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | 12 mois et – | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | |
| Total | Oui | N | 326 803 | 55 196 | 19 971 | 36 612 | 438 582 |
| | | % | 74,5 | 12,6 | 4,5 | 8,4 | 100,0 |
| | Non | N | 814 147 | 370 741 | 418 668 | 318 865 | 1 922 421 |
| | | % | 42,3 | 19,3 | 21,8 | 16,6 | 100,0 |
| 15-24 | Oui | N | 172 449 | 26 022 | 5 377 | 31 808 | 235 656 |
| | | % | 73,2 | 11,0 | 2,3 | 13,5 | 100,0 |
| | Non | N | 75 293 | 19 415 | 10 481 | 140 900 | 246 089 |
| | | % | 30,6 | 7,9 | 4,3 | 57,2 | 100,0 |
| 25-44 | Oui | N | 151 574 | 25 491 | 13 026 | 4 143 | 194 235 |
| | | % | 78,1 | 13,1 | 6,7 | 2,1 | 100,0 |
| | Non | N | 472 681 | 204 325 | 152 087 | 49 610 | 878 703 |
| | | % | 53,8 | 23,3 | 17,3 | 5,6 | 100,0 |
| 45-64 | Oui | N | 3 654 | 2 346 | 770 | 70 | 5 839 |
| | | % | 45,4 | 40,2 | 13,2 | 1,2 | 100,0 |
| | Non | N | 228 429 | 117 559 | 171 004 | 49 388 | 566 379 |
| | | % | 40,3 | 20,8 | 30,2 | 8,7 | 100,0 |
| 65 et + | Oui | N | 126 | 1 336 | 798 | 592 | 2 852 |
| | | % | 4,4 | 46,8 | 28,0 | 20,8 | 100,0 |
| | Non | N | 37 744 | 29 441 | 85 096 | 78 967 | 231 249 |
| | | % | 16,3 | 12,7 | 36,8 | 34,2 | 100,0 |

Valeurs manquantes: 269 962

N = population estimée

Tableau 56
Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, selon le niveau de revenu*, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Niveau de revenu | | Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé | | | | Total |
|------------------|---|---|-----------|---------------|---------|-----------|
| | | 12 mois et - | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | |
| Total | N | 1 105 532 | 401 738 | 395 042 | 357 257 | 2 259 568 |
| | % | 48,9 | 17,8 | 17,5 | 15,8 | 100,0 |
| Très pauvre | N | 73 045 | 33 847 | 37 845 | 45 765 | 190 502 |
| | % | 38,3 | 17,8 | 19,9 | 24,0 | 100,0 |
| Pauvre | N | 156 304 | 53 218 | 71 375 | 78 347 | 359 244 |
| | % | 43,5 | 14,8 | 19,9 | 21,8 | 100,0 |
| À revenu moyen | N | 611 419 | 220 048 | 214 135 | 178 707 | 1 224 310 |
| | % | 49,9 | 18,0 | 17,5 | 14,6 | 100,0 |
| Riche | N | 264 763 | 94 625 | 71 687 | 54 438 | 485 513 |
| | % | 54,4 | 19,5 | 14,8 | 11,2 | 100,0 |

Valeurs manquantes = 371 397

N = population estimée

Tableau 57
Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon la fréquence de l'auto-examen des seins, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Fréquence de l'auto-examen des seins | | Délai depuis le dernier test de Pap | | | | Total |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|---------------|---------|-----------|
| | | 12 mois et - | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | |
| Total | N | 1 169 401 | 435 294 | 458 707 | 360 414 | 2 423 816 |
| | % | 48,2 | 18,0 | 18,9 | 14,9 | 100,0 |
| 1 fois/mois | N | 338 973 | 110 976 | 108 247 | 53 073 | 611 269 |
| | % | 55,5 | 18,1 | 17,7 | 8,7 | 100,0 |
| 1 fois/2-3 mois | N | 231 504 | 92 964 | 94 604 | 38 403 | 457 475 |
| | % | 50,6 | 20,3 | 20,7 | 8,4 | 100,0 |
| Moins souvent | N | 289 918 | 104 539 | 119 846 | 64 676 | 578 979 |
| | % | 50,1 | 18,0 | 20,7 | 11,2 | 100,0 |
| Jamais | N | 309 006 | 126 815 | 136 009 | 204 263 | 776 094 |
| | % | 39,8 | 16,4 | 17,5 | 26,3 | 100,0 |

Valeurs manquantes = 207 149

N = population estimée

Tableau 58

Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le délai depuis la dernière mammographie, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Délai depuis la dernière mammographie | | Délai depuis le dernier test de Pap | | | | Total |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 12 mois et – | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | |
| Total | N | 1 142 495 | 430 994 | 441 825 | 352 694 | 2 368 008 |
| | % | 48,2 | 18,2 | 18,7 | 14,9 | 100,0 |
| 12 mois et – | N | 135 298 | 21 385 | 22 477 | 7 518 | 186 678 |
| | % | 72,5 | 11,5 | 12,0 | 4,0 | 100,0 |
| 1 à 2 ans | N | 70 740 | 45 134 | 23 565 | 4 763 | 144 202 |
| | % | 49,1 | 31,3 | 16,3 | 3,3 | 100,0 |
| Plus de 2 ans | N | 118 112 | 69 379 | 86 013 | 12 415 | 285 918 |
| | % | 41,3 | 24,3 | 30,1 | 4,3 | 100,0 |
| Jamais | N | 818 345 | 295 095 | 309 770 | 327 999 | 1 751 210 |
| | % | 46,7 | 16,9 | 17,7 | 18,7 | 100,0 |

Valeurs manquantes: 262 957

N = population estimée

Tableau 59

Délai depuis le dernier test de dépistage du cancer du col utérin, (test de Pap), selon le délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel de la santé, femmes âgées de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Délai depuis le dernier examen des seins par un professionnel | | Délai depuis le dernier test de Pap | | | | Total |
|---|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 12 mois et – | 1 à 2 ans | Plus de 2 ans | Jamais | |
| Total | N | 1 164 236 | 433 067 | 454 119 | 347 158 | 2 398 580 |
| | % | 48,5 | 18,1 | 18,9 | 14,5 | 100,0 |
| 12 mois et – | N | 965 711 | 78 248 | 84 329 | 53 802 | 1 182 090 |
| | % | 81,7 | 6,6 | 7,1 | 4,6 | 100,0 |
| 1 à 2 ans | N | 85 064 | 273 531 | 54 413 | 23 239 | 436 248 |
| | % | 19,5 | 62,7 | 12,5 | 5,3 | 100,0 |
| Plus de 2 ans | N | 58 752 | 52 779 | 257 533 | 39 921 | 408 984 |
| | % | 14,4 | 12,9 | 63,0 | 9,7 | 100,0 |
| Jamais | N | 54 709 | 28 510 | 57 843 | 230 196 | 371 258 |
| | % | 14,7 | 7,7 | 15,6 | 62,0 | 100,0 |

Valeurs manquantes: 232 386

N = population estimée

Chapitre 3

Environnement social

3.1

Support social

Tableau 60
Indice d'intégration sociale*, selon ses composantes, le sexe et l'âge,
 en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Composantes | Sexe | Âge | | | | Tous âges |
|----------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| | | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 et + | |
| Rencontre 1 fois/an ou jamais | H | 11,4 | 7,2 | 9,8 | 10,2 | 9,1 |
| | F | 6,6 | 5,7 | 6,4 | 8,0 | 6,3 |
| Temps libre plutôt seul | H | 11,0 | 12,2 | 13,5 | 18,4 | 12,9 |
| | F | 8,2 | 11,4 | 12,7 | 21,4 | 12,4 |
| Pas d'ami | H | 1,6 | 3,9 | 5,9 | 7,0 | 4,2 |
| | F | 2,0 | 4,4 | 5,8 | 8,6 | 4,8 |
| Pas d'enfant | H | 96,9 | 34,6 | 14,1 | 14,9 | 40,5 |
| | F | 89,9 | 27,4 | 13,6 | 18,5 | 34,9 |
| Pas de conjoint | H | 85,0 | 19,6 | 14,6 | 16,7 | 31,8 |
| | F | 70,7 | 21,1 | 24,0 | 47,7 | 34,8 |
| Pas de religion | H | 34,1 | 34,3 | 21,2 | 18,6 | 29,4 |
| | F | 27,7 | 26,7 | 16,9 | 14,8 | 22,9 |

Tableau 61
Support perçu, selon ses composantes, le sexe et l'âge, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Composantes | Sexe | Âge | | | | Tous âges |
|--|------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| | | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 et + | |
| Vie sociale plutôt ou vraiment insatisfaisante | H | 8,1 | 11,4 | 10,3 | 8,4 | 10,1 |
| | F | 8,0 | 12,3 | 11,4 | 10,8 | 11,1 |
| Rapports avec amis, plutôt ou vraiment insatisfaisants | H | 3,2 | 3,6 | 2,4 | 1,7 | 3,0 |
| | F | 4,0 | 3,1 | 1,7 | 1,8 | 2,7 |
| Rapports avec enfants, plutôt ou vraiment insatisfaisants | H | ** | 3,9 | 4,3 | 1,6 | 3,7 |
| | F | ** | 2,2 | 3,6 | 3,2 | 2,8 |
| Rapports avec conjoint, plutôt ou vraiment insatisfaisants | H | 6,5 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 4,4 |
| | F | 4,7 | 7,0 | 7,9 | 7,3 | 7,1 |
| Absence de confident | H | 14,1 | 19,8 | 17,2 | 12,1 | 17,2 |
| | F | 7,0 | 11,8 | 10,4 | 10,0 | 10,3 |
| Absence d'aide | H | 3,4 | 5,4 | 7,6 | 5,5 | 5,6 |
| | F | 2,0 | 3,3 | 4,4 | 4,5 | 3,5 |

** Effectif inférieur à 10

Tableau 62
Support perçu, selon la scolarité*, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 et plus, Québec, 1987

| Scolarité relative | Support perçu non satisfaisant | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | Hommes | | | |
| | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et + |
| Quintile 1 | 10,0 | 7,9 | 13,5 | 11,0 |
| Quintile 2 | 5,0 | 8,5 | 6,8 | 8,4 |
| Quintile 3 | 8,4 | 10,0 | 8,7 | 6,1 |
| Quintile 4 | 6,4 | 12,0 | 10,7 | 8,1 |
| Quintile 5 | 10,5 | 17,2 | 11,4 | 8,8 |
| | Femmes | | | |
| Quintile 1 | 7,6 | 11,0 | 13,2 | 9,6 |
| Quintile 2 | 8,5 | 10,4 | 8,8 | 14,5 |
| Quintile 3 | 4,9 | 11,4 | 12,7 | 8,4 |
| Quintile 4 | 11,0 | 12,8 | 12,3 | 9,9 |
| Quintile 5 | 8,9 | 16,2 | 9,8 | 11,1 |

Tableau 63

Support perçu, selon l'état matrimonial, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| État matrimonial | Support perçu non satisfaisant | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | Hommes | | | |
| | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et + |
| Marié | 4,3 | 8,9 | 8,0 | 6,8 |
| Séparé-divorcé | 22,2 | 18,9 | 28,1 | 12,6 |
| Veuf | ** | 96,2 | 19,8 | 20,0 |
| Seul | 8,0 | 23,4 | 15,3 | 6,2 |
| | Femmes | | | |
| Mariée | 9,1 | 10,4 | 9,3 | 9,7 |
| Séparée-divorcée | 7,5 | 19,6 | 21,9 | 30,8 |
| Veuve | ** | 24,5 | 12,0 | 11,1 |
| Seule | 7,6 | 18,7 | 16,7 | 6,8 |

** Effectif inférieur à 10

Tableau 64

Support perçu, selon l'activité, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Activité | Support perçu non satisfaisant | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | Hommes | | | |
| | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et + |
| Travail | 5,8 | 10,1 | 8,7 | ** |
| Études | 6,7 | 21,1 | ** | ** |
| Tient maison | ** | ** | ** | ** |
| Inactif/santé | ** | 20,7 | 17,5 | ** |
| Inactif/autres | 21,2 | 17,6 | 11,6 | 8,8 |
| | Femmes | | | |
| Travail | 7,1 | 11,9 | 13,2 | ** |
| Études | 7,5 | 16,1 | ** | ** |
| Tient maison | 12,9 | 12,3 | 9,5 | 12,8 |
| Inactive/santé | ** | 11,6 | 15,8 | ** |
| Inactive/autres | 9,4 | 16,4 | 12,3 | 9,1 |

** Effectif inférieur à 10

Tableau 65

Support perçu et événements stressants avant l'âge de 12 ans, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Événements stressants avant 12 ans | Support perçu non satisfaisant | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | Hommes | | | |
| | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et + |
| 1 événement ou plus | 11,1 | 14,1 | 10,0 | 9,3 |
| Aucun événement | 7,5 | 10,6 | 9,8 | 7,8 |
| | Femmes | | | |
| 1 événement ou plus | 10,8 | 17,0 | 13,3 | 12,0 |
| Aucun événement | 7,3 | 11,4 | 10,9 | 10,2 |

3.2

Événements stressants

Tableau 66
Fréquence de certains événements stressants*, selon l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Événements stressants | Sexe | Âge | | | | Tous âges |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| | | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 et + | |
| Décès d'un proche | H | 14,0 | 13,9 | 17,9 | 20,2 | 17,5 |
| | F | 17,8 | 16,6 | 21,3 | 30,9 | |
| Malade au foyer | H | 13,6 | 8,9 | 10,2 | 13,0 | 11,9 |
| | F | 12,4 | 12,4 | 14,0 | 15,8 | |
| Déménagement | H | 15,5 | 9,7 | 6,0 | 4,2 | 9,5 |
| | F | 18,8 | 8,5 | 5,5 | 6,2 | |
| Retraite | H | ** | ** | 15,5 | 63,0 | 8,7 |
| | F | | | 9,4 | 50,2 | |
| Perte d'emploi | H | 8,1 | 9,1 | 8,2 | 2,4 | 7,2 |
| | F | 8,0 | 7,2 | 4,9 | 2,1 | |
| Maladie personnelle | H | 3,3 | 3,2 | 9,1 | 15,2 | 6,3 |
| | F | 3,7 | 4,5 | 9,2 | 14,3 | |
| Divorce | H | 3,1 | 5,5 | 5,1 | 4,0 | 5,2 |
| | F | 4,1 | 6,1 | 6,8 | 4,3 | |
| Décès du conjoint | H | ** | 0,6 | 2,3 | 9,6 | 4,4 |
| | F | | 0,7 | 8,7 | 30,5 | |

** Ne s'applique pas

Tableau 67
Indice d'événements stressants*, selon la scolarité*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| | Indice d'événements stressants | | | Élevé |
|------------|--------------------------------|--------|-------|-------|
| | Aucun événement | Faible | Moyen | |
| Quintile 1 | 51,4 | 20,1 | 14,9 | 13,6 |
| Quintile 2 | 53,0 | 22,6 | 12,8 | 11,7 |
| Quintile 3 | 54,0 | 22,9 | 11,0 | 11,3 |
| Quintile 4 | 54,1 | 22,9 | 12,4 | 10,5 |
| Quintile 5 | 55,7 | 23,6 | 10,2 | 10,5 |

Tableau 68
Indice d'événements stressants*, selon l'état matrimonial, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| État matrimonial | Indice d'événements stressants | | | Élevé |
|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Aucun événement | Faible | Moyen | |
| Marié(e) | 57,4 | 21,9 | 11,8 | 8,8 |
| Séparé(e) — divorcé(e) | 34,9 | 23,7 | 18,9 | 22,5 |
| Veuf(ve) | 24,2 | 18,3 | 18,8 | 38,7 |
| Seul(e) | 56,4 | 25,6 | 9,4 | 8,6 |
| Total | 53,7 | 22,6 | 12,3 | 11,4 |

Tableau 69

Indice d'événements stressants*, selon différents événements de la vie, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Événements stressants | Sexe | Âge | | | | Tous âges |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| | | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 et + | |
| Décès du conjoint | H | ** | 8,9 | 6,9 | 7,4 | 7,6 |
| | F | | 9,5 | 7,5 | 7,7 | |
| Malade au foyer | H | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 6,9 |
| | F | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | |
| Maladie personnelle | H | 5,2 | 6,7 | 7,3 | 6,1 | 6,8 |
| | F | 6,4 | 7,7 | 7,1 | 6,4 | |
| Décès d'un proche | H | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 6,4 |
| | F | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | |
| Divorce | H | 5,1 | 6,7 | 5,7 | 4,6 | 6,3 |
| | F | 5,7 | 7,4 | 6,2 | 3,4 | |
| Perte d'emploi | H | 4,2 | 5,3 | 5,8 | 5,2 | 4,8 |
| | F | 4,9 | 4,1 | 5,0 | 3,6 | |
| Déménagement | H | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 4,0 |
| | F | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | |
| Retraite | H | ** | ** | 3,3 | 2,3 | 2,4 |
| | F | | | 2,5 | 2,3 | |

** Ne s'applique pas

Tableau 70

Personnes ayant un indice élevé d'événements stressants*, selon le statut d'activité, l'âge et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Statut d'activité | Sexe | Âge | | | |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|---------|
| | | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65 et + |
| Travail | H | 6,1 | 5,8 | 6,5 | ** |
| | F | 10,5 | 7,8 | 8,4 | ** |
| Études | H | 7,5 | 15,6 | ** | ** |
| | F | 8,5 | 16,3 | ** | ** |
| Maison | H | ** | ** | ** | ** |
| | F | 18,1 | 10,1 | 13,8 | 24,2 |
| Inactif/santé | H | ** | 18,7 | 32,0 | 17,2 |
| | F | ** | 19,8 | 40,4 | 29,8 |
| Inactif/autres | H | 12,2 | 21,1 | 21,6 | 21,1 |
| | F | 19,1 | 12,5 | 23,1 | 27,5 |
| Total du groupe d'âge | H | 7,6 | 7,8 | 12,3 | 19,5 |
| | F | 10,9 | 9,3 | 13,9 | 25,9 |

** Effectif inférieur à 10

Tableau 71
Problèmes de santé de longue durée et indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Durée des problèmes de santé | Indice d'événements stressants | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------|-------|-------|
| | Aucun événement | Faible | Moyen | Élevé |
| Plus de 12 mois | 42,7 | 48,1 | 54,6 | 62,0 |
| | 48,1 | 22,7 | 14,2 | 15,0 |
| Moins de 12 mois | 10,0 | 8,9 | 10,7 | 10,4 |
| | 54,5 | 20,2 | 13,4 | 12,0 |
| Sans problèmes de santé | 47,2 | 43,1 | 34,8 | 27,6 |
| | 59,6 | 22,8 | 10,1 | 7,5 |

Légende:
 pourcentage sur la ligne
 pourcentage sur la colonne

Tableau 72
Restriction d'activité et indice d'événements stressants*, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Durée des problèmes de santé | Indice d'événements stressants | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------|-------|-------|
| | Aucun événement | Faible | Moyen | Élevé |
| Plus de 12 mois | 3,9 | 5,7 | 10,9 | 15,4 |
| | 32,1 | 20,0 | 20,8 | 27,2 |
| Moins de 12 mois | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3,8 |
| | 27,3 | 21,6 | 20,4 | 30,7 |
| Sans restriction d'activité | 95,4 | 92,9 | 86,8 | 80,0 |
| | 55,5 | 22,7 | 11,7 | 10,1 |

Légende:
 pourcentage sur la ligne
 pourcentage sur la colonne

PARTIE 2

L'état de santé

Chapitre 4

Santé
physique

4.1

Fréquence et
nature des
problèmes
de santé

Tableau 73
Problèmes de santé, selon l'âge et le sexe, nombre et taux pour 100 habitants, Québec, 1987

| Problèmes de santé | Total | | | 0-14 ans | | | 15-24 ans | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F |
| Troubles mentaux | 8,8 | 6,2 | 11,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 4,5 | 3,6 | 5,4 |
| Diabète | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Troubles de la thyroïde | 1,3 | 0,3 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| Anémie | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 1,6 |
| Maux de tête | 8,3 | 5,0 | 11,5 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 7,5 | 4,0 | 11,1 |
| Troubles de la vision | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
| Troubles de l'audition | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Hypertension | 6,3 | 4,7 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Maladies cardiaques | 4,1 | 4,0 | 4,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
| Affections respiratoires aiguës | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 6,1 | 6,9 | 5,3 | 3,3 | 2,8 | 3,9 |
| Grippe | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 3,6 | 3,2 | 3,9 |
| Asthme, bronchite et emphysème | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 3,8 |
| Rhume des foies | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 3,3 | 3,9 | 2,7 | 10,1 | 9,8 | 10,4 |
| Allergies | 6,0 | 4,6 | 7,4 | 6,1 | 5,9 | 6,3 | 8,1 | 6,2 | 10,0 |
| Troubles de la dentition | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
| Ulcères gastriques et duodénaux | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Troubles digestifs fonctionnels | 4,0 | 2,8 | 5,2 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 0,7 | 2,8 |
| Autres troubles digestifs | 2,2 | 1,6 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 0,9 | 2,2 |
| Allergies et affections cutanées | 7,6 | 6,4 | 8,9 | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 6,6 | 10,2 |
| Arthrite et rhumatisme | 10,6 | 7,5 | 13,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 2,4 | 3,5 |
| Maux de dos | 7,2 | 7,0 | 7,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,7 | 3,8 | 3,6 |
| Autres affections ostéo-articulaires | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| Traumatismes | 5,3 | 6,3 | 4,3 | 3,7 | 4,2 | 3,1 | 6,6 | 8,8 | 4,4 |
| Troubles des organes génitaux féminins | 1,6 | 0,0 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 2,4 | 0,0 | 4,8 |
| Malaise et fatigue | 1,8 | 0,9 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 1,9 |
| Autres | 11,3 | 9,6 | 12,8 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 5,7 | 4,0 | 7,4 |
| Total | 112,3 | 90,9 | 133,0 | 55,9 | 57,7 | 53,9 | 80,5 | 64,3 | 97,1 |
| Population | 6 444 364 | 3 163 872 | 3 280 492 | 1 333 997 | 684 470 | 649 527 | 1 015 935 | 513 593 | 502 342 |

| Problèmes de santé | 25-44 ans | | | 45-64 ans | | | 65 ans et + | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F |
| Troubles mentaux | 8,4 | 5,8 | 10,9 | 13,8 | 9,8 | 17,5 | 23,3 | 18,0 | 27,2 |
| Diabète | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 6,5 | 5,5 | 7,2 |
| Troubles de la thyroïde | 1,2 | ,2 | 2,1 | 2,7 | 0,5 | 4,7 | 3,0 | 0,8 | 4,7 |
| Anémie | 1,5 | 0,3 | 2,6 | 1,9 | 0,3 | 3,4 | 2,2 | 1,6 | 2,6 |
| Maux de tête | 12,8 | 7,6 | 18,0 | 9,5 | 5,8 | 13,0 | 5,4 | 4,2 | 6,3 |
| Troubles de la vision | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 4,1 | 4,0 | 4,3 |
| Troubles de l'audition | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
| Hypertension | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 14,3 | 11,7 | 16,8 | 27,7 | 19,1 | 34,0 |
| Maladies cardiaques | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 7,7 | 8,4 | 7,0 | 21,9 | 23,5 | 20,8 |
| Affections respiratoires aiguës | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 2,7 |
| Grippe | 3,4 | 2,9 | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | 2,8 | 3,3 | 2,4 |
| Asthme, bronchite et emphysème | 2,6 | 1,6 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 8,4 | 11,8 | 6,0 |
| Rhume des foies | 8,4 | 8,0 | 8,7 | 3,8 | 3,4 | 4,1 | 2,6 | 2,3 | 2,9 |
| Allergies | 6,7 | 5,0 | 8,4 | 4,0 | 2,1 | 5,9 | 3,8 | 2,1 | 5,0 |
| Troubles de la dentition | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,3 |
| Ulcères gastriques et duodénaux | 1,7 | 2,3 | 1,2 | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
| Troubles digestifs fonctionnels | 3,8 | 2,4 | 5,2 | 5,2 | 3,8 | 6,4 | 11,5 | 8,6 | 13,5 |
| Autres troubles digestifs | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 5,6 | 4,2 | 6,6 |
| Allergies et affections cutanées | 8,3 | 5,9 | 10,7 | 5,5 | 4,3 | 6,6 | 7,1 | 7,9 | 6,6 |
| Arthrite et rhumatisme | 6,7 | 5,8 | 7,7 | 20,7 | 13,6 | 27,4 | 37,2 | 29,0 | 43,1 |
| Maux de dos | 9,9 | 10,1 | 9,7 | 11,5 | 11,1 | 12,0 | 9,5 | 7,9 | 10,6 |
| Autres affections ostéo-articulaires | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 3,3 |
| Traumatismes | 5,4 | 6,9 | 3,9 | 5,9 | 6,7 | 5,2 | 4,9 | 3,7 | 5,7 |
| Troubles des organes génitaux féminins | 1,7 | 0,0 | 3,4 | 2,8 | 0,1 | 5,3 | 0,7 | 0,0 | 1,1 |
| Malaise et fatigue | 2,6 | 1,4 | 3,8 | 2,1 | 1,3 | 2,8 | 2,4 | 1,2 | 3,2 |
| Autres | 9,1 | 6,7 | 11,4 | 14,8 | 13,2 | 16,3 | 30,5 | 31,7 | 29,6 |
| Total | 105,8 | 82,9 | 128,3 | 150,6 | 118,3 | 180,9 | 232,0 | 201,0 | 254,3 |
| Population | 2 194 712 | 1 086 607 | 1 108 105 | 1 295 209 | 625 916 | 669 285 | 405 981 | 174 294 | 231 687 |

Tableau 74

Nombre et pourcentage des individus ayant déclaré des problèmes de santé, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Total | | Aucun problème | | Un seul problème | | Plus d'un problème | | Au moins un problème | |
|--------------|----------|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| 0-14 | H | 684 470 | 100 | 400 600 | 58,5 | 202 895 | 29,6 | 80 975 | 11,8 | 283 870 | 41,5 |
| | F | 649 527 | 100 | 403 914 | 62,2 | 172 568 | 26,6 | 73 046 | 11,2 | 245 614 | 37,8 |
| | T | 1 333 997 | 100 | 804 513 | 60,3 | 375 462 | 28,1 | 154 022 | 11,5 | 529 484 | 39,7 |
| 15-24 | H | 513 593 | 100 | 305 809 | 59,5 | 132 151 | 25,7 | 75 633 | 14,7 | 207 784 | 40,5 |
| | F | 502 342 | 100 | 239 896 | 47,8 | 140 366 | 27,9 | 122 080 | 24,3 | 262 446 | 52,2 |
| | T | 1 015 935 | 100 | 545 705 | 53,7 | 272 517 | 26,8 | 197 713 | 19,5 | 470 230 | 46,3 |
| 25-44 | H | 1 086 607 | 100 | 571 505 | 52,6 | 290 418 | 26,7 | 224 683 | 20,7 | 515 101 | 47,4 |
| | F | 1 108 105 | 100 | 434 762 | 39,2 | 318 336 | 28,7 | 355 006 | 32,0 | 673 342 | 60,8 |
| | T | 2 194 712 | 100 | 1 006 268 | 45,8 | 608 753 | 27,7 | 579 689 | 26,4 | 1 188 442 | 54,2 |
| 45-64 | H | 625 916 | 100 | 263 594 | 42,1 | 177 623 | 28,4 | 184 699 | 29,5 | 362 322 | 57,9 |
| | F | 669 285 | 100 | 192 745 | 28,8 | 177 557 | 26,5 | 298 983 | 44,7 | 476 540 | 71,2 |
| | T | 1 295 201 | 100 | 456 339 | 35,2 | 355 180 | 27,4 | 483 682 | 37,3 | 838 862 | 64,8 |
| 65 et + | H | 253 285 | 100 | 59 004 | 23,3 | 66 760 | 26,4 | 127 521 | 50,3 | 194 281 | 76,7 |
| | F | 351 233 | 100 | 61 278 | 17,4 | 75 618 | 21,5 | 214 338 | 61,0 | 289 956 | 82,6 |
| | T | 604 518 | 100 | 120 283 | 19,9 | 142 375 | 23,6 | 341 859 | 56,6 | 484 234 | 80,1 |
| Total | H | 3 163 872 | 100 | 1 600 513 | 50,6 | 869 846 | 27,5 | 693 513 | 21,9 | 1 563 359 | 49,4 |
| | F | 3 280 492 | 100 | 1 332 595 | 40,6 | 884 444 | 27,0 | 1 063 454 | 32,4 | 1 947 898 | 59,4 |
| | T | 6 444 364 | 100 | 2 933 108 | 45,5 | 1 754 290 | 27,2 | 1 756 967 | 27,3 | 3 511 257 | 54,5 |

N = population estimée

Tableau 75

Problèmes de santé, selon l'âge, nombre et taux pour 100 habitants, (Enquête Santé Canada), Québec, 1978-1979

| Problèmes de santé | Total | | 0-14 ans | | 15-24 ans | | 25-44 ans | | 45-64 ans | | 15-64 ans | | 65 ans et + | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | N**/100h | | N**/100h | | N**/100h | | N**/100h | | N**/100h | | N**/100h | | N**/100h | |
| Troubles mentaux | 308 | 5,0 | 11 | 0,8 | 18 | 1,4 | 72 | 4,0 | 114 | 9,5 | 204 | 4,8 | 93 | 18,9 |
| Diabète | 104 | 1,7 | | | | | 19 | 1,0 | 56 | 4,7 | 77 | 1,8 | 26 | 5,3 |
| Troubles de la thyroïde | 61 | 1,0 | | | | | | | 24 | 2,0 | 44 | 1,0 | | |
| Anémie | 120 | 1,9 | | | | | 36 | 2,0 | 39 | 3,3 | 89 | 2,1 | | |
| Maux de tête | 237 | 3,8 | | | 28 | 2,2 | 101 | 5,6 | 81 | 6,8 | 210 | 4,9 | | |
| Troubles de la vision | 316 | 5,1 | 29 | 2,0 | 35 | 2,8 | 71 | 3,9 | 106 | 8,9 | 212 | 5,0 | 74 | 15,1 |
| Troubles de l'audition | 205 | 3,3 | 17 | 1,2 | 13 | 1,0 | 47 | 2,6 | 58 | 4,8 | 118 | 2,8 | 70 | 14,3 |
| Hypertension | 376 | 6,1 | | | | | 69 | 3,8 | 165 | 13,8 | 247 | 5,8 | 129 | 26,3 |
| Maladies cardiaques | 211 | 3,4 | | | | | 18 | 1,0 | 108 | 9,0 | 130 | 3,0 | 80 | 16,3 |
| Affections respiratoires aiguës | 106 | 1,7 | 35 | 2,4 | 17 | 1,3 | 29 | 1,6 | | | 62 | 1,5 | | |
| Grippe | 171 | 2,8 | 57 | 4,0 | 26 | 2,1 | 50 | 2,8 | 29 | 2,4 | 105 | 2,5 | | |
| Asthme, bronchite et emphysème | 325 | 5,2 | 60 | 4,2 | 47 | 3,7 | 63 | 3,5 | 95 | 7,9 | 204 | 4,8 | 60 | 12,2 |
| Rhume des foins, allergies | 462 | 7,5 | 81 | 5,6 | 127 | 10,1 | 166 | 9,2 | 78 | 6,5 | 371 | 8,7 | | |
| Troubles de la dentition | 468 | 7,6 | 82 | 5,7 | 87 | 6,9 | 161 | 8,9 | 101 | 8,4 | 349 | 8,2 | 37 | 7,5 |
| Ulcères gastriques & duodénaux | 107 | 1,7 | | | | | 38 | 2,1 | 38 | 3,2 | 89 | 2,1 | | |
| Troubles digestifs fonctionnels | 179 | 2,9 | 12 | 0,8 | | | 56 | 3,1 | 54 | 4,5 | 120 | 2,8 | 48 | 9,8 |
| Allergies & affections cutanées | 473 | 7,6 | 97 | 6,7 | 145 | 11,5 | 131 | 7,2 | 68 | 5,7 | 343 | 8,0 | 33 | 6,7 |
| Arthrite et rhumatisme | 639 | 10,3 | | | 28 | 2,2 | 124 | 6,8 | 297 | 24,8 | 449 | 10,5 | 184 | 37,5 |
| Autres affections ostéo-articulaires | 469 | 7,6 | | | 54 | 4,3 | 163 | 9,0 | 179 | 15,0 | 397 | 9,3 | 57 | 11,6 |
| Traumatismes | 114 | 1,8 | 14 | 1,0 | 27 | 2,1 | 36 | 2,0 | 22 | 1,8 | 85 | 2,0 | | |
| Autres | 738 | 11,9 | 41 | 2,8 | 101 | 8,0 | 207 | 11,4 | 203 | 17,0 | 511 | 12,0 | 185 | 37,7 |
| Total | 6 188 | 99,8 | 578 | 40,2 | 814 | 64,6 | 1 671 | 92,3 | 1 932 | 161,4 | 4 417 | 103,5 | 1 193 | 243,0 |
| Population | 6 198 | | 1 439 | | 1 260 | | 1 811 | | 1 197 | | 4 268 | | 491 | |

N** = population estimée en milliers

Tableau 76a

Problèmes de santé, selon l'activité chez les hommes, nombre et taux pour 100 hommes, Québec, 1987

| Problème de santé | Total N/100h | | Travail N/100h | | Études N/100h | | Tient maison N/100h | | Inactif/santé N/100h | | Inactif/autres N/100h | | Enfant/bébé N/100h | |
|---|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Troubles mentaux | 195 512 | 6,3 | 79 030 | 5,0 | 14 463 | 2,3 | 1 312 | 8,3 | 39 400 | 25,7 | 59 521 | 12,3 | 1 787 | 0,7 |
| Diabète | 43 597 | 1,4 | 13 181 | 0,8 | 1 896 | 0,3 | 120 | 0,8 | 8 960 | 5,8 | 19 202 | 4,0 | 238 | 0,1 |
| Troubles de la thyroïde | 8 361 | 0,3 | 4 403 | 0,3 | 201 | 0,0 | 61 | 0,4 | 704 | 0,5 | 2 415 | 0,5 | 578 | 0,2 |
| Anémie | 11 523 | 0,4 | 3 692 | 0,2 | 788 | 0,1 | | 0,0 | 2 933 | 1,9 | 2 465 | 0,5 | 1 646 | 0,6 |
| Maux de tête | 158 881 | 5,1 | 101 828 | 6,5 | 18 621 | 3,0 | 1 726 | 11,0 | 11 686 | 7,6 | 24 603 | 5,1 | 418 | 0,2 |
| Troubles de la vision | 31 345 | 1,0 | 11 935 | 0,8 | 5 879 | 0,9 | 89 | 0,6 | 2 904 | 1,9 | 9 917 | 2,1 | 621 | 0,2 |
| Troubles de l'audition | 40 779 | 1,3 | 9 203 | 0,6 | 9 142 | 1,5 | 107 | 0,7 | 3 909 | 2,5 | 7 201 | 1,5 | 11 218 | 4,2 |
| Hypertension | 147 262 | 4,7 | 64 515 | 4,1 | 782 | 0,1 | 2 795 | 17,7 | 23 287 | 15,2 | 55 883 | 11,6 | | 0,0 |
| Maladies cardiaques | 126 843 | 4,1 | 27 834 | 1,8 | 1 591 | 0,3 | 366 | 2,3 | 37 575 | 24,5 | 57 603 | 12,0 | 1 874 | 0,7 |
| Affections respiratoires aiguës | 102 991 | 3,3 | 34 123 | 2,2 | 25 649 | 4,1 | 383 | 2,4 | 4 456 | 2,9 | 12 538 | 2,6 | 25 842 | 9,8 |
| Grippe | 105 698 | 3,4 | 43 763 | 2,8 | 26 571 | 4,3 | 350 | 2,2 | 6 216 | 4,0 | 14 209 | 2,9 | 14 589 | 5,5 |
| Asthme, bronchite et emphysème | 118 535 | 3,8 | 30 559 | 1,9 | 26 495 | 4,3 | 1 042 | 6,6 | 14 237 | 9,3 | 34 818 | 7,2 | 11 382 | 4,3 |
| Rhume des foies | 183 516 | 5,9 | 114 936 | 7,3 | 44 582 | 7,2 | 1 029 | 6,5 | 4 792 | 3,1 | 16 268 | 3,4 | 3 907 | 1,5 |
| Allergies | 139 312 | 4,5 | 66 693 | 4,2 | 46 330 | 7,5 | 1 120 | 7,1 | 4 778 | 3,1 | 11 638 | 2,4 | 8 752 | 3,3 |
| Troubles de la dentition | 31 992 | 1,0 | 14 473 | 0,9 | 10 601 | 1,7 | 310 | 2,0 | 1 204 | 0,8 | 2 969 | 0,6 | 2 436 | 0,9 |
| Ulcères gastriques & duodénaux | 56 829 | 1,8 | 33 693 | 2,1 | 1 883 | 0,3 | 1 845 | 11,7 | 7 051 | 4,6 | 12 357 | 2,6 | | 0,0 |
| Troubles digestifs fonctionnels | 87 725 | 2,8 | 35 328 | 2,2 | 8 977 | 1,4 | 1 661 | 10,5 | 8 463 | 5,5 | 26 174 | 5,4 | 7 123 | 2,7 |
| Autres troubles digestifs | 51 070 | 1,6 | 25 598 | 1,6 | 2 451 | 0,4 | 1 781 | 11,3 | 7 331 | 4,8 | 13 213 | 2,7 | 696 | 0,3 |
| Allergies & affections cutanées | 199 217 | 6,4 | 78 511 | 5,0 | 49 819 | 8,0 | 2 791 | 18,9 | 10 020 | 6,5 | 29 953 | 6,2 | 27 942 | 10,6 |
| Arthrite et rhumatisme | 238 459 | 7,7 | 95 668 | 6,1 | 10 058 | 1,6 | 2 837 | 18,0 | 46 106 | 30,0 | 82 847 | 17,2 | 942 | 0,4 |
| Maux de dos | 219 935 | 7,1 | 144 626 | 9,2 | 6 192 | 1,0 | 1 379 | 8,8 | 31 376 | 20,4 | 36 362 | 7,5 | | 0,0 |
| Autres affections ostéo-articulaires | 16 243 | 0,5 | 7 067 | 0,4 | 1 057 | 0,2 | 209 | 1,3 | 3 694 | 2,4 | 3 819 | 0,8 | 398 | 0,2 |
| Traumatismes | 197 369 | 6,3 | 84 736 | 5,4 | 40 755 | 6,6 | 1 002 | 6,4 | 41 268 | 26,9 | 23 158 | 4,8 | 6 449 | 2,4 |
| Malaise et fatigue | 29 601 | 1,0 | 19 012 | 1,2 | 1 521 | ,2 | | 0,0 | 4 266 | 2,8 | 4 802 | 1,0 | | 0,0 |
| Autres | 299 694 | 9,6 | 83 015 | 5,3 | 35 041 | 5,6 | 291 | 1,8 | 71 193 | 47,0 | 88 195 | 18,3 | 20 959 | 7,9 |
| Total | 2 842 788 | 91,4 | 1 227 424 | 78,0 | 391 346 | 63,0 | 24 784 | 157,3 | 399 307 | 260,1 | 652 131 | 135,3 | 149 798 | 56,7 |
| Population | 3 111 076 | | 1 574 424 | | 621 386 | | 15 759 | | 153 545 | | 481 981 | | 263 980 | |

N = population

Tableau 76b

Problèmes de santé, selon l'activité chez les femmes, nombre et taux pour 100 femmes, Québec, 1987

| Problème de santé | Total N/100h | | Travail N/100h | | Études N/100h | | Tient maison N/100h | | Inactif/santé N/100h | | Inactif/autres N/100h | | Enfant/bébé N/100h | |
|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Troubles mentaux | 367 847 | 11,4 | 84 219 | 8,0 | 18 483 | 3,0 | 155 936 | 17,6 | 40 210 | 40,0 | 68 465 | 20,1 | 533 | 0,2 |
| Diabète | 59 079 | 1,8 | 7 857 | 0,7 | 1 120 | 0,2 | 29 295 | 3,3 | 4 141 | 4,1 | 16 666 | 4,9 | | 0,0 |
| Troubles de la thyroïde | 74 786 | 2,3 | 20 742 | 2,0 | 2 192 | 0,4 | 35 624 | 4,0 | 1 852 | 1,8 | 13 918 | 4,1 | 458 | 0,2 |
| Anémie | 71 132 | 2,2 | 30 213 | 2,9 | 3 401 | 0,6 | 21 457 | 2,4 | 5 875 | 5,8 | 9 751 | 2,9 | 435 | 0,2 |
| Maux de tête | 373 983 | 11,6 | 168 548 | 16,0 | 34 313 | 5,6 | 126 017 | 14,2 | 13 589 | 13,5 | 30 946 | 9,1 | 570 | 0,2 |
| Troubles de la vision | 43 136 | 1,3 | 9 715 | 0,9 | 5 985 | 1,0 | 12 668 | 1,4 | 4 150 | 4,1 | 8 691 | 2,5 | 1 926 | 0,8 |
| Troubles de l'audition | 38 570 | 1,2 | 5 427 | 0,5 | 4 843 | 0,8 | 10 934 | 1,2 | 942 | 0,9 | 4 603 | 1,4 | 11 821 | 5,0 |
| Hypertension | 258 298 | 8,0 | 43 328 | 4,1 | 1 604 | 0,3 | 118 462 | 13,3 | 19 738 | 19,6 | 75 166 | 22,0 | | 0,0 |
| Maladies cardiaques | 139 364 | 4,3 | 15 089 | 1,4 | 2 839 | 0,5 | 55 443 | 6,2 | 15 665 | 15,6 | 49 503 | 14,5 | 825 | 0,3 |
| Affections respiratoires aiguës | 106 085 | 3,3 | 28 728 | 2,7 | 26 473 | 4,4 | 24 549 | 2,8 | 3 299 | 3,3 | 8 125 | 2,4 | 14 910 | 6,3 |
| Grippe | 127 714 | 4,0 | 36 125 | 3,4 | 25 322 | 4,2 | 38 128 | 4,3 | 2 191 | 2,2 | 11 492 | 3,4 | 14 456 | 6,1 |
| Asthme, bronchite et emphysème | 132 139 | 4,1 | 33 363 | 3,2 | 21 211 | 3,5 | 45 769 | 5,2 | 4 584 | 4,6 | 18 493 | 5,4 | 8 719 | 3,7 |
| Rhume des foins | 200 727 | 6,2 | 91 406 | 8,7 | 34 882 | 5,7 | 49 504 | 5,6 | 6 989 | 7,0 | 15 601 | 4,6 | 344 | 1,0 |
| Allergies | 237 315 | 7,4 | 92 577 | 8,8 | 49 311 | 8,1 | 57 322 | 6,5 | 5 547 | 5,5 | 23 430 | 6,9 | 9 127 | 3,8 |
| Troubles de la dentition | 39 113 | 1,2 | 16 581 | 1,6 | 10 541 | 1,7 | 6 394 | 0,7 | 249 | 0,2 | 2 809 | 0,8 | 2 540 | 1,1 |
| Ulcères gastriques & duodénaux | 45 406 | 1,4 | 12 289 | 1,2 | 892 | 0,1 | 20 095 | 2,3 | 4 570 | 4,5 | 7 559 | 2,2 | | 0,0 |
| Troubles digestifs fonctionnels | 169 982 | 5,3 | 53 628 | 5,1 | 9 112 | 1,5 | 60 651 | 6,8 | 11 709 | 11,7 | 30 838 | 9,0 | 4 044 | 1,7 |
| Autres troubles digestifs | 87 941 | 2,7 | 24 638 | 2,3 | 2 965 | 0,5 | 31 419 | 3,5 | 10 338 | 10,3 | 16 904 | 5,0 | 1 677 | 0,7 |
| Allergies & affections cutanées | 287 518 | 8,9 | 102 317 | 9,7 | 63 494 | 10,4 | 71 102 | 8,0 | 12 215 | 12,2 | 22 401 | 6,6 | 15 988 | 6,7 |
| Arthrite et rhumatisme | 442 211 | 13,7 | 100 485 | 9,6 | 13 095 | 2,2 | 192 763 | 21,7 | 33 278 | 33,1 | 101 791 | 29,9 | 798 | 0,3 |
| Maux de dos | 244 157 | 7,6 | 90 511 | 8,6 | 9 955 | 1,6 | 90 208 | 10,2 | 18 407 | 18,3 | 35 077 | 10,3 | | 0,0 |
| Autres affections ostéo-articulaires | 43 542 | 1,3 | 11 301 | 1,1 | 2 872 | 0,5 | 14 954 | 1,7 | 4 438 | 4,4 | 9 366 | 2,7 | 612 | 0,3 |
| Traumatismes | 137 302 | 4,3 | 38 739 | 3,7 | 26 758 | 4,4 | 31 979 | 3,6 | 17 508 | 17,4 | 18 247 | 5,4 | 4 070 | 1,7 |
| Troubles des organes génitaux féminins | 103 842 | 3,2 | 46 876 | 4,5 | 13 635 | 2,2 | 28 412 | 3,2 | 3 920 | 3,9 | 10 930 | 3,2 | 68 | 0,0 |
| Malaise et fatigue | 83 658 | 2,6 | 31 604 | 3,0 | 4 447 | 0,7 | 32 586 | 3,7 | 5 641 | 5,6 | 9 054 | 2,7 | 326 | 0,1 |
| Autres | 419 599 | 13,0 | 109 116 | 10,4 | 41 580 | 6,8 | 127 853 | 14,4 | 50 983 | 50,8 | 72 564 | 21,3 | 17 503 | 7,3 |
| Total | 4 334 446 | 134,3 | 1 305 425 | 124,2 | 431 328 | 70,9 | 1 489 523 | 167,7 | 302 030 | 300,7 | 692 392 | 203,1 | 113 749 | 47,7 |
| Population | 3 227 267 | | 1 050 853 | | 608 566 | | 888 177 | | 100 452 | | 340 920 | | 238 300 | |

N = population estimée

Tableau 77

Problèmes de santé, selon le niveau de revenu, nombre et taux pour 100 habitants, Québec, 1987

| Problèmes de santé | Total N/100h | | Très pauvres N/100h | | Pauvres N/100h | | À revenu N/100h | | Riches N/100h | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|
| Troubles mentaux | 509 676 | 8,8 | 77 247 | 13,5 | 121 569 | 13,1 | 246 249 | 8,1 | 64 611 | 5,3 |
| Diabète | 86 794 | 1,5 | 10 547 | 1,8 | 22 389 | 2,4 | 37 243 | 1,2 | 16 614 | 1,4 |
| Troubles de la thyroïde | 73 276 | 1,3 | 6 532 | 1,1 | 16 982 | 1,8 | 37 497 | 1,2 | 12 264 | 1,0 |
| Anémie | 74 521 | 1,3 | 12 396 | 2,2 | 15 503 | 1,7 | 35 205 | 1,2 | 11 416 | 0,9 |
| Maux de tête | 492 604 | 8,5 | 53 682 | 9,4 | 80 022 | 8,6 | 253 095 | 8,3 | 105 805 | 8,7 |
| Troubles de la vision | 65 813 | 1,1 | 6 473 | 1,1 | 16 957 | 1,8 | 32 935 | 1,1 | 9 447 | 0,8 |
| Troubles de l'audition | 78 984 | 1,4 | 8 102 | 1,4 | 14 465 | 1,6 | 40 072 | 1,3 | 16 345 | 1,3 |
| Hypertension | 349 715 | 6,1 | 36 553 | 6,4 | 83 386 | 9,0 | 169 629 | 5,6 | 60 147 | 4,9 |
| Maladies cardiaques | 228 564 | 4,0 | 25 457 | 4,5 | 59 684 | 6,5 | 114 458 | 3,8 | 28 965 | 2,4 |
| Affections respiratoires aiguës | 198 269 | 3,4 | 23 851 | 4,2 | 31 574 | 3,4 | 100 184 | 3,3 | 42 660 | 3,5 |
| Grippe | 218 056 | 3,8 | 26 914 | 4,7 | 38 889 | 4,2 | 113 296 | 3,7 | 38 956 | 3,2 |
| Asthme, bronchite et emphysème | 230 874 | 4,0 | 33 779 | 5,9 | 49 512 | 5,4 | 118 783 | 3,9 | 28 800 | 2,4 |
| Rhume des foins | 367 911 | 6,4 | 25 305 | 4,4 | 38 287 | 4,1 | 205 902 | 6,8 | 98 417 | 8,1 |
| Allergies | 358 040 | 6,2 | 34 638 | 6,1 | 49 194 | 5,3 | 188 723 | 6,2 | 85 484 | 7,0 |
| Troubles de la dentition | 66 965 | 1,2 | 9 127 | 1,6 | 5 905 | 0,6 | 36 590 | 1,2 | 15 343 | 1,3 |
| Ulcères gastriques & duodénaux | 91 041 | 1,6 | 11 409 | 2,0 | 21 065 | 2,3 | 46 526 | 1,5 | 12 041 | 1,0 |
| Troubles digestifs fonctionnels | 227 069 | 3,9 | 25 518 | 4,5 | 52 511 | 5,7 | 111 444 | 3,7 | 37 595 | 3,1 |
| Autres troubles digestifs | 126 884 | 2,2 | 17 256 | 3,0 | 24 144 | 2,6 | 60 344 | 2,0 | 25 140 | 2,1 |
| Allergies & affections cutanées | 447 679 | 7,8 | 47 656 | 8,3 | 70 320 | 7,6 | 240 372 | 7,9 | 89 331 | 7,3 |
| Arthrite et rhumatisme | 588 584 | 10,2 | 58 728 | 10,3 | 136 348 | 14,7 | 302 938 | 10,0 | 90 570 | 7,4 |
| Maux de dos | 413 535 | 7,2 | 44 438 | 7,8 | 63 165 | 6,8 | 219 882 | 7,2 | 86 050 | 7,0 |
| Autres affections ostéo-articulaires | 52 947 | 0,9 | 5 706 | 1,0 | 11 165 | 1,2 | 26 335 | 0,9 | 9 741 | 0,8 |
| Traumatismes | 316 178 | 5,5 | 36 379 | 6,4 | 59 813 | 6,5 | 150 633 | 4,9 | 69 352 | 5,7 |
| Tr. des organes génitaux féminins | 98 073 | 1,7 | 7 727 | 1,4 | 16 209 | 1,8 | 47 293 | 1,6 | 26 844 | 2,2 |
| Malaise et fatigue | 107 709 | 1,9 | 11 635 | 2,0 | 24 177 | 2,6 | 53 671 | 1,8 | 18 225 | 1,5 |
| Autres | 647 173 | 11,2 | 79 111 | 13,9 | 143 657 | 15,5 | 321 071 | 10,5 | 103 334 | 8,5 |
| Total | 6 516 935 | 113,1 | 736 170 | 128,9 | 1 266 893 | 136,9 | 3 310 371 | 108,7 | 1 203 501 | 98,5 |
| Population | 5 762 245 | | 571 186 | | 925 225 | | 3 044 465 | | 1 221 369 | |

N = population estimée

4.2

Accidents

Tableau 78
Accidents de travail, selon les conditions de travail, l'âge et le sexe, population âgée de 15 à 64 ans, Québec, 1987

| Conditions de travail | Âge | H | | F | |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | N | % | N | % |
| Jour | Total | 41 514 | 36,9 | 14 204 | 15,9 |
| | 15-34 | 22 214 | 46,6 | 5 027 | 11,4 |
| | 35-54 | 16 867 | 3,2 | 8 735 | 21,9 |
| | 55-64 | 2 432 | 20,2 | 441 | 7,7 |
| Nuit | Total | 3 466 | 74,5 | 393 | 20,0 |
| | 15-34 | 2 075 | 74,0 | — | — |
| | 35-54 | 1 391 | 82,0 | 393 | 87,3 |
| | 55-64 | — | — | — | — |
| Quarts | Total | 9 036 | 50,2 | 1 155 | 11,6 |
| | 15-34 | 4 911 | 49,5 | 566 | 8,7 |
| | 35-54 | 3 958 | 55,1 | 588 | 19,0 |
| | 55-64 | 166 | 18,5 | — | — |
| Appel | Total | 641 | 8,9 | 3 811 | 44,7 |
| | 15-34 | 500 | 1,1 | 827 | 20,4 |
| | 35-54 | 141 | 6,5 | 2 636 | 69,0 |
| | 55-64 | — | — | 347 | 53,5 |
| Parfois la nuit | Total | 7 579 | 29,9 | 1 475 | 12,6 |
| | 15-34 | 4 120 | 32,4 | 868 | 13,7 |
| | 35-54 | 3 254 | 30,9 | 607 | 13,9 |
| | 55-64 | 204 | 10,2 | — | — |
| Nuit inconnu | Total | 237 | 8,9 | — | — |
| | 15-34 | — | — | — | — |
| | 35-54 | 53 | 5,7 | — | — |
| | 55-64 | 184 | 14,3 | — | — |
| Total | Total | 62 476 | 36,7 | 21 041 | 17,0 |
| | 15-34 | 33 822 | 43,3 | 7 290 | 11,6 |
| | 35-54 | 25 665 | 34,1 | 12 962 | 24,6 |
| | 55-64 | 2 988 | 17,7 | 788 | 9,4 |

N = population estimée

Tableau 79a

Taux d'accidents, selon le type d'accidents et la catégorie professionnelle, population active âgée de 15 ans et plus, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987

| Catégorie professionnelle | Type d'accident | | | | | | | | Total |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-------|
| | Accident de la route | Accident de travail | Accident maison-intérieur | Accident maison-extérieur | Accident dans un lieu de loisir | Accident dans un lieu public | Accident à l'école | Autre accident | |
| Col blanc (direction) | 4,9 | 14,6 | 5,5 | 1,0 | 15,3 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 43,4 |
| Col blanc (administration) | 5,3 | 10,8 | 3,9 | 2,0 | 5,6 | 1,5 | — | — | 28,9 |
| Col bleu (primaire) | 7,8 | 33,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | — | — | 46,1 |
| Col bleu (secondaire) | 6,1 | 57,8 | 5,3 | 2,4 | 6,5 | 0,8 | 0,4 | — | 79,7 |
| Col bleu (tertiaire) | 4,9 | 38,4 | 3,3 | 2,0 | 5,9 | 1,6 | — | 0,5 | 56,8 |

Tableau 79b

Distribution des types d'accidents, selon la catégorie professionnelle et le sexe, en pourcentage, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Catégorie professionnelle | Sexe | Type d'accident | | | | | | | | Total |
|----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | Accident de la route | Accident de travail | Accident maison-intérieur | Accident maison-extérieur | Accident dans un lieu de loisir | Accident dans un lieu public | Accident à l'école | Autre accident | |
| Total | Total | 10,9 | 55,3 | 9,5 | 3,6 | 17,4 | 2,7 | 0,3 | 0,6 | 100,0 |
| | H | 8,6 | 59,4 | 6,9 | 3,5 | 18,8 | 2,1 | 0,4 | 0,3 | 100,0 |
| | F | 17,4 | 43,8 | 15,4 | 4,1 | 13,5 | 4,5 | 0,0 | 1,4 | 100,0 |
| Col blanc (direction) | Total | 11,6 | 33,5 | 12,7 | 2,5 | 35,2 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 100,0 |
| | H | 7,2 | 24,4 | 15,1 | 4,1 | 46,3 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 100,0 |
| | F | 18,9 | 48,3 | 8,9 | 0,0 | 16,9 | 3,1 | 0,0 | 4,0 | 100,0 |
| Col blanc (administration) | Total | 18,1 | 37,2 | 13,6 | 6,7 | 19,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | H | 8,8 | 50,5 | 4,8 | 7,8 | 20,2 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | F | 27,9 | 23,1 | 22,9 | 5,6 | 18,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Col bleu (primaire) | Total | 14,6 | 70,8 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | H | 14,6 | 70,8 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | F | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Col bleu (secondaire) | Total | 7,7 | 72,4 | 6,7 | 3,1 | 8,3 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 100,0 |
| | H | 9,0 | 70,5 | 7,7 | 3,1 | 8,8 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |
| | F | 0,0 | 84,1 | 0,9 | 3,1 | 5,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Col bleu (tertiaire) | Total | 8,6 | 67,6 | 6,0 | 3,3 | 10,4 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| | H | 8,2 | 74,0 | 1,4 | 1,8 | 11,6 | 1,8 | 0,0 | 1,1 | 100,0 |
| | F | 10,4 | 36,7 | 27,9 | 10,5 | 4,7 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

Tableau 79c

Distribution de la population, selon les types d'accidents, la catégorie professionnelle et le sexe, population active âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Catégorie professionnelle | Sexe | Type d'accident | | | | | | | | Total |
|----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | Accident de la route | Accident de travail | Accident maison-intérieur | Accident maison-extérieur | Accident dans un lieu de loisir | Accident dans un lieu public | Accident à l'école | Autre accident | |
| Total | Total | 14 795 | 74 957 | 12 385 | 4 942 | 23 583 | 3 654 | 421 | 837 | 135 574 |
| | H | 8 535 | 59 215 | 6 862 | 3 478 | 18 713 | 2 048 | 421 | 329 | 99 601 |
| | F | 6 259 | 15 742 | 5 523 | 1 463 | 4 870 | 1 605 | | 508 | 35 972 |
| Col blanc (direction) | Total | 3 898 | 11 254 | 4 279 | 843 | 11 814 | 825 | 176 | 509 | 33 598 |
| | H | 1 490 | 5 091 | 3 147 | 843 | 9 653 | 427 | 176 | | 20 827 |
| | F | 2 407 | 6 163 | 1 132 | | 2 161 | 398 | | 509 | 12 769 |
| Col blanc (administration) | Total | 4 296 | 8 853 | 3 235 | 1 601 | 4 589 | 1 225 | | | 23 799 |
| | H | 1 081 | 6 190 | 597 | 953 | 2 475 | 964 | | | 12 260 |
| | F | 3 215 | 2 663 | 2 638 | 648 | 2 114 | 262 | | | 11 540 |
| Col bleu (primaire) | Total | 520 | 2 535 | 115 | 113 | 228 | 62 | | | 3 573 |
| | H | 520 | 2 512 | 115 | 113 | 228 | 62 | | | 3 550 |
| | F | | 24 | | | | | | | 24 |
| Col bleu (secondaire) | Total | 3 051 | 28 572 | 2 659 | 1 209 | 3 285 | 435 | 245 | | 39 456 |
| | H | 3 051 | 23 924 | 2 609 | 1 040 | 2 975 | 84 | 245 | | 33 928 |
| | F | | 4 648 | 50 | 160 | 310 | 350 | | | 5 527 |
| Col bleu (tertiaire) | Total | 3 030 | 23 743 | 2 098 | 1 175 | 3 667 | 1 107 | | 328 | 35 148 |
| | H | 2 393 | 21 498 | 394 | 529 | 3 382 | 510 | | 328 | 29 036 |
| | F | 637 | 2 244 | 1 704 | 646 | 285 | 596 | | | 6 112 |

Tableau 80a

Distribution de la population, selon les types d'accidents, le statut d'activité et le sexe, population active âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Statut d'activité | Sexe | Type d'accident | | | | | | | | Total |
|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | Accident de la route | Accident de travail | Accident maison-intérieur | Accident maison-extérieur | Accident dans un lieu de loisir | Accident dans un lieu public | Accident à l'école | Autre accident | |
| Total | Total | 31 547 12,0 | 107 110 40,6 | 35 841 13,6 | 11 909 4,5 | 55 671 21,1 | 11 749 4,5 | 8 178 3,1 | 1 846 0,7 | 263 852 100,0 |
| | H | 16 114 9,7 | 82 730 49,6 | 15 952 9,6 | 8 213 4,9 | 35 106 21,0 | 3 568 2,1 | 3 941 2,4 | 1 281 0,8 | 166 908 100,0 |
| | F | 15 432 15,9 | 24 379 25,1 | 19 889 20,5 | 3 695 3,8 | 20 566 21,2 | 8 181 8,4 | 4 237 4,4 | 565 0,6 | 96 943 100,0 |
| Travail | Total | 14 795 10,9 | 75 600 55,5 | 12 385 9,1 | 4 942 3,6 | 23 698 17,4 | 3 654 2,7 | 421 0,3 | 837 0,6 | 136 332 100,0 |
| | H | 8 535 8,5 | 59 857 59,7 | 6 862 6,8 | 3 479 3,5 | 18 713 18,7 | 2 048 2,0 | 421 0,4 | 327 0,3 | 100 244 100,0 |
| | F | 6 259 17,3 | 15 742 43,6 | 5 523 15,3 | 1 463 4,1 | 4 985 13,8 | 1 606 4,5 | 0,0 | 510 1,4 | 36 088 100,0 |
| Études | Total | 3 592 7,8 | 2 021 4,4 | 5 226 11,3 | 1 544 3,3 | 23 760 51,5 | 2 060 4,5 | 7 694 16,7 | 198 0,4 | 46 095 100,0 |
| | H | 1 081 7,0 | 1 083 4,2 | 4 010 15,5 | 1 297 5,0 | 13 315 51,5 | 678 2,6 | 3 456 13,4 | 198 0,8 | 25 839 100,0 |
| | F | 1 791 8,8 | 938 4,6 | 1 216 6,0 | 247 1,2 | 10 445 51,6 | 1 382 6,8 | 4 238 20,9 | 0,0 | 20 256 100,0 |
| Tenir maison | Total | 3 018 15,5 | 2 341 12,0 | 6 651 34,2 | 676 3,5 | 3 899 20,0 | 2 819 14,5 | 0,0 | 55 0,3 | 19 459 100,0 |
| | H | 107 13,2 | 397 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309 38,0 | 0,0 | 0,0 | 813 100,0 |
| | F | 2 911 15,6 | 1 944 10,4 | 6 651 35,7 | 676 3,6 | 3 899 20,9 | 2 510 13,5 | 0,0 | 55 0,3 | 18 646 100,0 |
| Inactif/santé | Total | 5 287 16,8 | 20 551 65,2 | 1 935 6,2 | 1 075 3,4 | 1 194 3,8 | 1 042 3,3 | 0,0 | 420 1,3 | 31 504 100,0 |
| | H | 3 348 15,5 | 15 487 71,6 | 645 3,0 | 1 075 5,0 | 489 2,3 | 166 0,8 | 0,0 | 420 1,9 | 21 630 100,0 |
| | F | 1 939 19,6 | 5 064 51,3 | 1 290 13,1 | 0,0 | 705 7,1 | 876 8,9 | 0,0 | 0,0 | 9 874 100,0 |
| Inactif/autres | Total | 4 855 18,7 | 6 597 25,5 | 6 459 24,9 | 2 781 10,7 | 2 725 10,5 | 2 099 8,1 | 63 0,2 | 338 1,3 | 25 917 100,0 |
| | H | 2 323 14,9 | 5 906 37,8 | 2 450 15,7 | 1 896 12,1 | 2 360 15,1 | 293 1,9 | 63 0,4 | 337 2,2 | 15 628 100,0 |
| | F | 2 532 24,6 | 691 6,7 | 4 009 39,0 | 885 8,6 | 366 3,6 | 1 806 17,6 | 0,0 | 0,0 | 10 289 100,0 |
| Enfant/bébé | Total | 0,0 | 0,0 | 3 183 70,1 | 892 19,6 | 396 8,7 | 73 1,6 | 0,0 | 1 0,0 | 4 545 100,0 |
| | H | 0,0 | 0,0 | 1 985 72,0 | 467 17,0 | 229 8,3 | 73 2,7 | 0,0 | 1 0,0 | 2 754 100,0 |
| | F | 0,0 | 0,0 | 1 198 66,9 | 425 23,8 | 166 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 790 100,0 |

Tableau 80b
Taux d'accidents, selon le statut d'activité, population active âgée de 15 ans et plus, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987

| Statut d'activité | Type d'accident | | | | | | | | Total route |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| | Accident de la route | Accident de travail | Accident maison-intérieur | Accident maison-extérieur | Accident dans un lieu de loisir | Accident dans un lieu public | Accident à l'école | Autre accident | |
| Travail | 5,6 | 28,8 | 4,8 | 1,9 | 1,4 | 9,1 | 0,2 | 0,3 | 51,9 |
| Études | 2,9 | 1,6 | 4,3 | 1,3 | 1,6 | 19,3 | 6,2 | 0,2 | 37,5 |
| Tenir maison | 3,3 | 2,7 | 7,4 | 0,7 | 3,1 | 4,2 | 0,0 | 0,1 | 21,5 |
| Inactif/santé | 20,6 | 80,9 | 7,9 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 0,0 | 1,7 | 124,1 |
| Inactif/autres | 5,9 | 8,1 | 7,8 | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 0,1 | 0,4 | 31,5 |
| Enfant/bébé | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 1,6 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |

Tableau 81
Accidents de travail, selon l'âge, le sexe et l'occupation, population active de 15 à 64 ans, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987

| Occupation | Âge | H | | F | |
|---|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | N | Taux | N | Taux |
| 1. Direction, administration | Total | 1 000 | 6,0 | 81 | 1,1 |
| | 15-34 | 170 | 3,8 | 81 | 2,8 |
| | 35-54 | 830 | 8,3 | — | 0,0 |
| | 55-64 | — | 0,0 | — | 0,0 |
| 2. Professionnel (Sc. nature. génie, médecin) | Total | 2 098 | 12,6 | 1 568 | 17,5 |
| | 15-34 | 704 | 9,2 | 609 | 11,8 |
| | 35-54 | 1 393 | 17,6 | 959 | 27,7 |
| | 55-64 | — | 0,0 | — | 0,0 |
| 3. Enseignement | Total | 1 439 | 23,5 | 1 729 | 20,4 |
| | 15-34 | 223 | 16,6 | 1 079 | 45,1 |
| | 35-54 | 1 216 | 28,8 | 649 | 11,5 |
| | 55-64 | — | 0,0 | — | 0,0 |
| 4. Soins infirmiers, thérapie | Total | 1 052 | 50,6 | 3 922 | 41,0 |
| | 15-34 | 767 | 51,3 | 1 136 | 25,5 |
| | 35-64 | 285 | 56,6 | 2 438 | 54,4 |
| | 55-64 | — | 0,0 | 348 | 55,4 |
| 5. Secrétariat et autre personnel de bureau | Total | 3 861 | 34,1 | 3 305 | 8,3 |
| | 15-34 | 1 906 | 32,6 | 1 625 | 6,9 |
| | 35-54 | 1 852 | 42,0 | 1 425 | 9,8 |
| | 55-64 | 102 | 9,5 | 254 | 13,3 |
| 6. Vente | Total | 2 328 | 12,7 | 958 | 7,9 |
| | 15-34 | 1 780 | 19,9 | 848 | 13,2 |
| | 35-54 | 547 | 7,3 | 110 | 2,2 |
| | 55-64 | — | 0,0 | — | 0,0 |
| 7. Services (sécurité, prép. des aliments, logement, services personnels) | Total | 5 879 | 35,4 | 3 035 | 18,9 |
| | 15-34 | 2 976 | 34,1 | 870 | 10,5 |
| | 35-54 | 2 527 | 39,9 | 1 746 | 25,8 |
| | 55-64 | 375 | 24,2 | 418 | 40,5 |
| 8. Agriculture et industries primaires (mines, etc.) | Total | 3 470 | 51,9 | — | 0,0 |
| | 15-34 | 2 055 | 70,0 | — | 0,0 |
| | 35-54 | 1 362 | 45,3 | — | 0,0 |
| | 55-64 | 53 | 7,0 | — | 0,0 |
| 9. Transformation (métaux, pâtes et papier, etc.) et autre col bleu | Total | 16 971 | 91,5 | 1 607 | 68,3 |
| | 15-34 | 8 959 | 95,1 | 155 | 15,4 |
| | 35-54 | 7 406 | 97,6 | 1 452 | 124,5 |
| | 55-64 | 604 | 39,2 | — | 0,0 |
| 10. Montage, assemblage, réparation | Total | 9 122 | 60,1 | 3 147 | 50,7 |
| | 15-34 | 5 518 | 73,8 | 443 | 18,6 |
| | 35-54 | 3 449 | 53,7 | 2 703 | 82,7 |
| | 55-64 | 154 | 12,0 | — | 0,0 |
| 11. Construction, éclairage, excavation | Total | 11 310 | 75,1 | 23 | 13,7 |
| | 15-34 | 4 838 | 75,6 | 23 | 24,9 |
| | 35-54 | 5 484 | 80,5 | — | 0,0 |
| | 55-64 | 986 | 53,4 | — | 0,0 |
| 12. Transport routier, emplois qualifiés, autres emplois | Total | 9 728 | 54,6 | 420 | 14,2 |
| | 15-34 | 4 836 | 57,4 | 370 | 27,0 |
| | 35-54 | 3 861 | 48,0 | 49 | 3,2 |
| | 55-64 | 1 030 | 75,6 | — | 0,0 |
| Total | Total | 68 263 | 42,4 | 19 799 | 17,3 |
| | 15-34 | 34 737 | 47,6 | 7 243 | 12,4 |
| | 35-54 | 30 219 | 41,6 | 11 534 | 23,0 |
| | 55-64 | 3 307 | 21,4 | 1 021 | 16,3 |

N = population estimée

Tableau 82
Lésions et accidents, selon l'âge, le sexe et l'occupation, population active de 15 à 64 ans, taux pour 1 000 habitants, Québec, 1987

| Occupation | Âge | H | | F | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | N | Taux | N | Taux |
| 1. Direction, administration | Total | 7 014 | 42,1 | 2 924 | 41,5 |
| | 15-34 | 2 674 | 61,0 | 321 | 11,2 |
| | 35-54 | 3 944 | 39,8 | 2 603 | 66,2 |
| | 55-64 | 395 | 16,7 | — | 0,0 |
| 2. Professionnel (Sc. nature. génie, médecin) | Total | 7 999 | 48,1 | 2 595 | 29,0 |
| | 15-34 | 3 291 | 43,3 | 1 028 | 20,0 |
| | 35-54 | 3 830 | 48,3 | 1 567 | 45,3 |
| | 55-64 | 877 | 78,8 | — | 0,0 |
| 3. Enseignement | Total | 6 529 | 106,8 | 3 600 | 42,5 |
| | 15-34 | 1 012 | 75,4 | 991 | 41,4 |
| | 35-54 | 5 268 | 124,8 | 2 553 | 45,3 |
| | 55-64 | 248 | 45,4 | 55 | 12,5 |
| 4. Soins infirmiers, thérapie | Total | 2 081 | 100,1 | 3 906 | 40,9 |
| | 15-34 | 1 355 | 90,6 | 745 | 16,7 |
| | 35-64 | 725 | 144,0 | 2 229 | 49,7 |
| | 55-64 | — | 0,0 | 931 | 148,2 |
| 5. Secrétariat et autre personnel de bureau | Total | 6 345 | 56,1 | 15 283 | 38,4 |
| | 15-34 | 4 295 | 73,6 | 9 083 | 38,7 |
| | 35-54 | 1 611 | 36,5 | 5 345 | 37,0 |
| | 55-64 | 437 | 41,0 | 854 | 44,8 |
| 6. Vente | Total | 7 236 | 39,5 | 4 355 | 36,1 |
| | 15-34 | 5 088 | 57,1 | 1 289 | 20,1 |
| | 35-54 | 2 147 | 28,7 | 2 289 | 46,5 |
| | 55-64 | — | 0,0 | 776 | 105,1 |
| 7. Services (sécurité, prép. des aliments, logement, services personnels) | Total | 9 026 | 54,4 | 8 517 | 53,1 |
| | 15-34 | 4 492 | 51,6 | 4 981 | 60,3 |
| | 35-54 | 4 225 | 66,7 | 2 115 | 31,3 |
| | 55-64 | 308 | 19,9 | 1 420 | 137,7 |
| 8. Agriculture et industries primaires (mines, etc.) | Total | 3 399 | 50,8 | 280 | 31,3 |
| | 15-34 | 1 653 | 56,3 | — | 0,0 |
| | 35-54 | 1 546 | 51,4 | 280 | 52,3 |
| | 55-64 | 199 | 26,6 | — | 0,0 |
| 9. Transformation (métaux, pâtes et papier, etc.) et autre col bleu | Total | 15 445 | 83,2 | 2 445 | 104,0 |
| | 15-34 | 9 394 | 99,7 | 823 | 82,0 |
| | 35-54 | 5 059 | 66,6 | 1 621 | 139,0 |
| | 55-64 | 991 | 64,2 | — | 0,0 |
| 10. Montage, assemblage, réparation | Total | 9 330 | 61,5 | 4 042 | 65,1 |
| | 15-34 | 5 211 | 69,7 | 1 268 | 53,2 |
| | 35-54 | 3 464 | 53,9 | 2 774 | 84,9 |
| | 55-64 | 655 | 51,1 | — | 0,0 |
| 11. Construction, éclairage, excavation | Total | 12 913 | 85,8 | 23 | 13,7 |
| | 15-34 | 6 861 | 107,2 | 23 | 24,9 |
| | 35-54 | 5 493 | 80,6 | — | 0,0 |
| | 55-64 | 557 | 30,1 | — | 0,0 |
| 12. Transport routier, emplois qualifiés, autres emplois | Total | 11 814 | 66,3 | 284 | 9,6 |
| | 15-34 | 6 227 | 74,0 | 284 | 20,7 |
| | 35-54 | 5 020 | 62,5 | — | 0,0 |
| | 55-64 | 566 | 41,5 | — | 0,0 |
| Total | Total | 99 136 | 61,6 | 48 261 | 42,1 |
| | 15-34 | 51 559 | 70,7 | 20 841 | 35,9 |
| | 35-54 | 42 339 | 58,3 | 23 381 | 46,6 |
| | 55-64 | 5 238 | 33,9 | 4 038 | 64,7 |

N = population estimée

4.3

Indice de
santé globale

Tableau 83

Indice de santé globale*, selon le sexe, la scolarité*, l'indice de saines habitudes de vie*, la satisfaction face à la vie sociale, la détresse psychologique* et les événements stressants*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Indices | Probabilité moyenne brute | | | Probabilité moyenne standardisée par âge | | | | | |
|---|---------------------------|-------|--------------|--|--------------------------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | H | F | Total | H | Intervalle de confiance à 95 % | F | Intervalle de confiance à 95 % | Total | Intervalle de confiance à 95 % |
| Population | 0,464 | 0,536 | 0,501 | | | | | | |
| Scolarité relative | | | | | | | | | |
| Quintile 1 | 0,466 | 0,553 | 0,514 | 0,471 | ±0,015 | 0,555 | ±0,013 | 0,513 | ±0,010 |
| Quintile 2 | 0,463 | 0,529 | 0,495 | 0,460 | ±0,013 | 0,539 | ±0,014 | 0,500 | ±0,010 |
| Quintile 3 | 0,466 | 0,539 | 0,506 | 0,469 | ±0,014 | 0,539 | ±0,013 | 0,504 | ±0,010 |
| Quintile 4 | 0,456 | 0,534 | 0,496 | 0,460 | ±0,013 | 0,534 | ±0,013 | 0,497 | ±0,009 |
| Quintile 5 | 0,468 | 0,519 | 0,493 | 0,466 | ±0,012 | 0,519 | ±0,013 | 0,493 | ±0,009 |
| Saines habitudes de vie | | | | | | | | | |
| Score faible | 0,498 | 0,608 | 0,546 | 0,490 | ±0,016 | 0,602 | ±0,018 | 0,546 | ±0,012 |
| Score moyen | 0,472 | 0,553 | 0,514 | 0,474 | ±0,012 | 0,554 | ±0,011 | 0,515 | ±0,008 |
| Score élevé | 0,446 | 0,511 | 0,480 | 0,451 | ±0,008 | 0,517 | ±0,008 | 0,484 | ±0,006 |
| Satisfaction face à la vie sociale | | | | | | | | | |
| Très satisfaisante | 0,441 | 0,508 | 0,475 | 0,443 | ±0,010 | 0,509 | ±0,010 | 0,477 | ±0,007 |
| Plutôt satisfaisante | 0,468 | 0,538 | 0,504 | 0,467 | ±0,008 | 0,539 | ±0,008 | 0,503 | ±0,005 |
| Non satisfaisante | 0,515 | 0,606 | 0,564 | 0,518 | ±0,019 | 0,602 | ±0,017 | 0,560 | ±0,013 |
| Détresse psychologique | | | | | | | | | |
| Quintile 1 | 0,394 | 0,446 | 0,415 | 0,395 | ±0,012 | 0,448 | ±0,015 | 0,423 | ±0,009 |
| Quintile 2 | 0,433 | 0,481 | 0,454 | 0,434 | ±0,013 | 0,485 | ±0,015 | 0,460 | ±0,010 |
| Quintile 3 | 0,466 | 0,515 | 0,491 | 0,469 | ±0,013 | 0,520 | ±0,013 | 0,495 | ±0,009 |
| Quintile 4 | 0,488 | 0,538 | 0,516 | 0,492 | ±0,014 | 0,552 | ±0,013 | 0,522 | ±0,010 |
| Quintile 5 | 0,560 | 0,619 | 0,597 | 0,562 | ±0,015 | 0,623 | ±0,012 | 0,593 | ±0,009 |
| Événements stressants | | | | | | | | | |
| Aucun | 0,426 | 0,502 | 0,464 | 0,439 | ±0,008 | 0,514 | ±0,008 | 0,477 | ±0,006 |
| Faible | 0,468 | 0,527 | 0,496 | 0,461 | ±0,012 | 0,525 | ±0,013 | 0,493 | ±0,009 |
| Moyen | 0,530 | 0,578 | 0,558 | 0,508 | ±0,018 | 0,569 | ±0,016 | 0,539 | ±0,012 |
| Élevé | 0,538 | 0,644 | 0,618 | 0,552 | ±0,019 | 0,621 | ±0,016 | 0,587 | ±0,012 |

Tableau 84
Indice de santé globale*, selon l'âge, le sexe et le niveau de revenu*, Québec, 1987

| | Probabilité moyenne brute | | | Probabilité moyenne standardisée par âge | | | | | Intervalle de confiance à 95 % |
|-----------------------------|---------------------------|-------|--------------|--|--------------------------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | H | F | Total | H | Intervalle de confiance à 95 % | F | Intervalle de confiance à 95 % | Total | |
| Population | 0,479 | 0,537 | 0,508 | 0,483 | ±0,005 | 0,533 | ±0,005 | 0,508 | ±0,003 |
| Âge | | | | | | | | | |
| 0-14 | 0,410 | 0,393 | 0,402 | | | | | 0,401 | ±0,007 |
| 15-24 | 0,417 | 0,483 | 0,450 | | | | | 0,451 | ±0,008 |
| 25-44 | 0,468 | 0,539 | 0,504 | | | | | 0,504 | ±0,006 |
| 45-64 | 0,547 | 0,619 | 0,584 | | | | | 0,584 | -0,007 |
| 65 et + | 0,673 | 0,716 | 0,698 | | | | | 0,695 | -0,011 |
| Suffisance de revenu | | | | | | | | | |
| Très pauvre | 0,491 | 0,561 | 0,528 | 0,522 | ±0,016 | 0,554 | ±0,015 | 0,553 | ±0,011 |
| Pauvre | 0,501 | 0,568 | 0,536 | 0,492 | ±0,013 | 0,557 | ±0,012 | 0,524 | ±0,009 |
| À revenu moyen | 0,476 | 0,536 | 0,506 | 0,478 | ±0,007 | 0,540 | ±0,007 | 0,509 | ±0,005 |
| Riche | 0,479 | 0,506 | 0,493 | 0,480 | ±0,011 | 0,516 | ±0,011 | 0,497 | ±0,007 |

Tableau 85
Indice de santé globale*, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987

| Âge/sexe | | Incapacité sévère | | Incapacité restreinte | | Problème chronique lourd | | Problème chronique léger | | Symptomatique | | Aucune maladie | | Inconnu | | Total N |
|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| 0-14 | H | 8 976 | 1,3 | 14 986 | 2,2 | 21 692 | 3,2 | 101 467 | 14,8 | 135 548 | 19,8 | 400 375 | 58,5 | 1 427 | 0,2 | 684 471 |
| | F | 6 936 | 1,1 | 10 759 | 1,7 | 17 591 | 2,7 | 92 799 | 14,3 | 116 630 | 18,0 | 402 513 | 62,0 | 2 299 | 0,4 | 649 527 |
| | Total | 15 912 | 1,2 | 25 746 | 1,9 | 39 283 | 2,9 | 194 266 | 14,6 | 252 179 | 18,9 | 802 888 | 60,2 | 3 725 | 0,3 | 1 333 999 |
| 15-24 | H | 5 097 | 1,0 | 6 573 | 1,3 | 30 201 | 5,9 | 96 235 | 18,7 | 67 408 | 13,1 | 304 633 | 59,3 | 3 445 | 0,7 | 513 593 |
| | F | 5 469 | 1,1 | 12 292 | 2,4 | 58 449 | 11,6 | 112 969 | 22,5 | 69 940 | 13,9 | 239 626 | 47,7 | 3 597 | 0,7 | 502 342 |
| | Total | 10 566 | 1,0 | 18 865 | 1,9 | 88 650 | 8,7 | 209 204 | 20,6 | 137 349 | 13,5 | 544 259 | 53,6 | 7 042 | 0,7 | 1 015 935 |
| 25-44 | H | 22 676 | 2,1 | 31 293 | 2,9 | 99 715 | 9,2 | 246 337 | 22,7 | 111 705 | 10,3 | 567 301 | 52,2 | 7 580 | 0,7 | 1 086 607 |
| | F | 26 890 | 2,4 | 30 487 | 2,8 | 186 790 | 16,9 | 279 035 | 25,2 | 144 105 | 13,0 | 433 756 | 39,1 | 7 042 | 0,6 | 1 108 104 |
| | Total | 49 566 | 2,3 | 61 780 | 2,8 | 286 506 | 13,1 | 525 373 | 23,9 | 255 810 | 11,7 | 1 001 057 | 45,6 | 14 622 | 0,7 | 2 194 711 |
| 45-64 | H | 54 996 | 8,8 | 24 208 | 3,9 | 79 641 | 12,7 | 149 320 | 23,9 | 48 932 | 7,8 | 261 583 | 41,8 | 7 236 | 1,2 | 625 916 |
| | F | 60 050 | 9,0 | 26 280 | 3,9 | 144 144 | 21,5 | 164 806 | 24,6 | 72 425 | 10,8 | 193 048 | 28,8 | 8 533 | 1,3 | 669 285 |
| | Total | 115 046 | 8,9 | 50 487 | 3,9 | 223 785 | 17,3 | 314 126 | 24,3 | 121 357 | 9,4 | 454 631 | 35,1 | 15 769 | 1,2 | 1 295 201 |
| 65 et + | H | 36 567 | 14,4 | 13 402 | 5,3 | 59 626 | 23,5 | 62 529 | 24,7 | 20 560 | 8,1 | 58 391 | 23,1 | 2 210 | 0,9 | 253 285 |
| | F | 61 281 | 17,4 | 16 969 | 4,8 | 100 929 | 28,7 | 80 214 | 22,8 | 29 793 | 8,5 | 60 100 | 17,1 | 1 948 | 0,6 | 351 233 |
| | Total | 97 848 | 16,2 | 30 371 | 5,0 | 160 555 | 26,6 | 142 743 | 23,6 | 50 353 | 8,3 | 118 491 | 19,6 | 4 157 | 0,7 | 604 518 |
| Total | H | 128 313 | 4,1 | 90 461 | 2,9 | 290 875 | 9,2 | 655 888 | 20,7 | 384 154 | 12,1 | 1 592 283 | 50,3 | 21 897 | 0,7 | 3 163 872 |
| | F | 160 625 | 4,9 | 96 787 | 3,0 | 507 904 | 15,5 | 729 823 | 22,2 | 432 894 | 13,2 | 1 329 042 | 40,5 | 23 418 | 0,7 | 3 280 492 |
| | Total | 288 938 | 4,5 | 187 248 | 2,9 | 798 779 | 12,4 | 1 385 712 | 21,5 | 817 047 | 12,7 | 2 921 325 | 45,3 | 45 315 | 0,7 | 6 444 364 |

N = population estimée

Chapitre 5

Santé mentale

Tableau 86
Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987

| No de question | Population de l'échantillon | Pourcentage sur le total | No de question | Population de l'échantillon | Pourcentage sur le total |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| QAA1 | 141 | — | QAA32 | 557 | — |
| 1 | 3 661 | 18,7 | 1 | 14 758 | 77,0 |
| 2 | 7 991 | 40,8 | 2 | 3 643 | 19,0 |
| 3 | 5 700 | 29,1 | 3 | 559 | 2,9 |
| 4 | 1 845 | 9,4 | 4 | 207 | 1,1 |
| 5 | 386 | 2,0 | | | |
| QAA2 | 160 | — | QAA33 | 657 | — |
| 1 | 7 737 | 39,5 | 1 | 11 513 | 60,4 |
| 2 | 10 828 | 55,3 | 2 | 6 406 | 33,6 |
| 3 | 999 | 5,1 | 3 | 843 | 4,4 |
| | | | 4 | 305 | 1,6 |
| QAA3 | 209 | — | QAA34 | 631 | — |
| 1 | 1 514 | 7,8 | 1 | 12 843 | 67,3 |
| 2 | 8 046 | 41,2 | 2 | 4 763 | 24,9 |
| 3 | 8 026 | 41,1 | 3 | 946 | 5,0 |
| 4 | 1 929 | 9,9 | 4 | 541 | 2,8 |
| QAA4 | 142 | — | QAA35 | 580 | — |
| 1 | 8 289 | 42,3 | 1 | 12 079 | 63,1 |
| 2 | 9 532 | 48,7 | 2 | 5 380 | 28,1 |
| 3 | 1 424 | 7,3 | 3 | 1 078 | 5,6 |
| 4 | 337 | 1,7 | 4 | 607 | 3,2 |
| QAA30 | 473 | — | QAA36 | 594 | — |
| 1 | 7 133 | 37,1 | 1 | 13 568 | 70,9 |
| 2 | 9 878 | 51,3 | 2 | 4 782 | 25,0 |
| 3 | 1 660 | 8,6 | 3 | 559 | 2,9 |
| 4 | 579 | 3,0 | 4 | 221 | 1,2 |
| QAA31 | 599 | — | QAA37 | 1 037 | — |
| 1 | 15 915 | 83,2 | 1 | 12 747 | 68,2 |
| 2 | 2 755 | 14,4 | 2 | 3 909 | 20,9 |
| 3 | 351 | 1,8 | 3 | 1 047 | 5,6 |
| 4 | 103 | 0,5 | 4 | 983 | 5,3 |

Tableau 86 (suite)
Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987

| No de question | Population de l'échantillon | Pourcentage sur le total | No de question | Population de l'échantillon | Pourcentage sur le total |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| QAA38 | 638 | — | QAA47 | 387 | — |
| 1 | 13 723 | 71,9 | 1 | 9 633 | 49,8 |
| 2 | 4 061 | 21,3 | 2 | 7 168 | 37,1 |
| 3 | 851 | 4,5 | 3 | 1 791 | 9,3 |
| 4 | 451 | 2,4 | 4 | 745 | 3,9 |
| QAA39 | 617 | — | QAA48 | 462 | — |
| 1 | 10 807 | 56,6 | 1 | 13 155 | 68,3 |
| 2 | 6 817 | 35,7 | 2 | 4 901 | 25,4 |
| 3 | 1 072 | 5,6 | 3 | 820 | 4,3 |
| 4 | 411 | 2,2 | 4 | 387 | 2,0 |
| QAA40 | 667 | — | QAA49 | 521 | — |
| 1 | 8 345 | 43,8 | 1 | 15 432 | 80,4 |
| 2 | 8 240 | 43,2 | 2 | 3 144 | 16,4 |
| 3 | 1 859 | 9,8 | 3 | 482 | 2,5 |
| 4 | 613 | 3,2 | 4 | 145 | 0,8 |
| QAA41 | 628 | — | QAA50 | 500 | — |
| 1 | 9 409 | 49,3 | 1 | 15 032 | 78,2 |
| 2 | 8 272 | 43,3 | 2 | 3 357 | 17,5 |
| 3 | 1 110 | 5,8 | 3 | 600 | 3,1 |
| 4 | 304 | 1,6 | 4 | 234 | 1,2 |
| QAA42 | 528 | — | QAA51 | 534 | — |
| 1 | 11 817 | 61,6 | 1 | 16 834 | 87,7 |
| 2 | 5 958 | 31,0 | 2 | 1 915 | 10,0 |
| 3 | 1 032 | 5,4 | 3 | 309 | 1,6 |
| 4 | 389 | 2,0 | 4 | 132 | 0,7 |
| QAA43 | 624 | — | QAA52 | 495 | — |
| 1 | 10 858 | 56,8 | 1 | 9 120 | 47,4 |
| 2 | 6 946 | 36,4 | 2 | 8 108 | 42,2 |
| 3 | 979 | 5,1 | 3 | 1 428 | 7,4 |
| 4 | 317 | 1,7 | 4 | 573 | 3,0 |
| QAA44 | 547 | — | QAA53 | 529 | — |
| 1 | 16 047 | 83,7 | 1 | 17 897 | 93,2 |
| 2 | 2 506 | 13,1 | 2 | 1 023 | 5,3 |
| 3 | 389 | 2,0 | 3 | 166 | 0,9 |
| 4 | 235 | 1,2 | 4 | 109 | 0,6 |
| QAA45 | 548 | — | QAA54 | 604 | — |
| 1 | 12 980 | 67,7 | 1 | 12 657 | 66,2 |
| 2 | 5 194 | 27,1 | 2 | 5 603 | 29,3 |
| 3 | 681 | 3,5 | 3 | 643 | 3,4 |
| 4 | 321 | 1,7 | 4 | 217 | 1,1 |
| QAA46 | 415 | — | QAA55 | 542 | — |
| 1 | 12 731 | 65,9 | 1 | 9 942 | 51,8 |
| 2 | 5 861 | 30,4 | 2 | 7 770 | 40,5 |
| 3 | 552 | 2,9 | 3 | 1 134 | 5,9 |
| 4 | 166 | 0,9 | 4 | 335 | 1,7 |

Tableau 86 (suite)
Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987

| No de question | Population de l'échantillon | Pourcentage sur le total | No de question | Population de l'échantillon | Pourcentage sur le total |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|
| QAA56 | 551 | — | QAA92e | 712 | — |
| 1 | 10 780 | 56,2 | 1 | 12 907 | 67,9 |
| 2 | 7 214 | 37,6 | 2 | 4 339 | 22,8 |
| 3 | 862 | 4,5 | 3 | 1 193 | 6,3 |
| 4 | 317 | 1,7 | 4 | 573 | 3,0 |
| QAA57 | 510 | — | QAA92f | 807 | — |
| 1 | 11 856 | 61,7 | 1 | 11 024 | 58,3 |
| 2 | 6 157 | 32,0 | 2 | 5 455 | 28,8 |
| 3 | 921 | 4,8 | 3 | 1 635 | 8,6 |
| 4 | 280 | 1,5 | 4 | 804 | 4,2 |
| QAA58 | 469 | — | QAA92g | 804 | — |
| 1 | 9 634 | 50,0 | 1 | 1 432 | 7,6 |
| 2 | 6 870 | 35,7 | 2 | 3 046 | 16,1 |
| 3 | 1 789 | 9,3 | 3 | 5 381 | 28,4 |
| 4 | 961 | 5,0 | 4 | 9 062 | 47,9 |
| QAA59 | 904 | — | QAA92h | 795 | — |
| 1 | 2 067 | 11,0 | 1 | 13 246 | 70,0 |
| 2 | 16 753 | 89,0 | 2 | 3 617 | 19,1 |
| QAA60 | 17 859 | — | 3 | 1 358 | 7,2 |
| 1 | 732 | 39,2 | 4 | 708 | 3,7 |
| 2 | 1 134 | 60,8 | QAA92i | 782 | — |
| QAA61 | 17 904 | — | 1 | 12 186 | 64,3 |
| 1 | 621 | 34,1 | 2 | 3 943 | 20,8 |
| 2 | 1 199 | 65,9 | 3 | 1 747 | 9,2 |
| QAA62 | 19 119 | — | 4 | 1 066 | 5,6 |
| 1 | 163 | 27,0 | QAA92j | 849 | — |
| 2 | 442 | 73,0 | 1 | 1 862 | 9,9 |
| QAA92a | 645 | — | 2 | 3 676 | 19,5 |
| 1 | 960 | 5,0 | 3 | 5 909 | 31,3 |
| 2 | 3 108 | 16,3 | 4 | 7 428 | 39,4 |
| 3 | 5 528 | 29,0 | QAA92k | 762 | — |
| 4 | 9 483 | 49,7 | 1 | 12 969 | 68,4 |
| QAA92b | 657 | — | 2 | 3 720 | 19,6 |
| 1 | 6 599 | 34,6 | 3 | 1 302 | 6,9 |
| 2 | 2 502 | 13,1 | 4 | 971 | 5,1 |
| 3 | 2 640 | 13,8 | QAA92l | 814 | — |
| 4 | 7 327 | 38,4 | 1 | 11 640 | 61,6 |
| QAA92c | 799 | — | 2 | 4 775 | 25,3 |
| 1 | 2 988 | 15,8 | 3 | 1 607 | 8,5 |
| 2 | 2 778 | 14,7 | 4 | 888 | 4,7 |
| 3 | 3 741 | 19,8 | QAA92m | 861 | — |
| 4 | 9 418 | 49,8 | 1 | 2 180 | 11,6 |
| QAA92d | 729 | — | 2 | 3 674 | 19,5 |
| 1 | 13 076 | 68,8 | 3 | 5 006 | 26,5 |
| 2 | 4 099 | 21,6 | 4 | 8 003 | 42,4 |
| 3 | 1 176 | 6,2 | | | |
| 4 | 643 | 3,4 | | | |

Tableau 86 (fin)
Distribution des fréquences de certaines variables du questionnaire auto-administré, Québec, 1987

| No de question | Population de l'échantillon | Pourcentage sur le total | No de question | Population de l'échantillon | Pourcentage sur le total |
|----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| QAA92n | 593 | — | QAA96 | 1 442 | — |
| 1 | 1 052 | 5,5 | 1 | 596 | 3,3 |
| 2 | 2 017 | 10,5 | 2 | 17 686 | 96,7 |
| 3 | 4 536 | 23,7 | Événements stressants | 566 | — |
| 4 | 11 526 | 60,2 | Aucun événement | 10 272 | 53,6 |
| QAA93 | 1 103 | — | Faible | 4 315 | 22,5 |
| 1 | 1 480 | 7,9 | Moyen | 2 372 | 12,4 |
| 2 | 17 140 | 92,1 | Élevé | 2 199 | 11,5 |
| QAA94 | 1 123 | — | ILFELD | 779 | — |
| 1 | 2 061 | 11,1 | Quintile 1 | 3 751 | 19,8 |
| 2 | 16 541 | 88,9 | Quintile 2 | 3 485 | 18,4 |
| QAA95 | 1 425 | — | Quintile 3 | 3 965 | 20,9 |
| 1 | 1 214 | 6,6 | Quintile 4 | 3 707 | 19,6 |
| 2 | 17 085 | 93,4 | Quintile 5 | 4 037 | 21,3 |

Tableau 87
Détresse psychologique*, selon l'état matrimonial, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| État matrimonial | Niveau de détresse psychologique | | | Total |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Faible (Q1-Q3) | Modéré (Quint4) | Élevé (Quint5) | |
| Marié(e) | 1 973 361 | 619 372 | 621 107 | 3 213 840 |
| | 41,18 | 12,92 | 12,96 | 67,06 |
| | 61,40 | 19,27 | 19,33 | |
| | 69,58 | 65,86 | 61,15 | |
| Séparé(e)-Divorcé(e) | 191 797 | 81 567 | 121 781 | 395 145 |
| | 4,00 | 1,70 | 2,54 | 8,25 |
| | 48,54 | 20,64 | 30,82 | |
| | 6,76 | 8,67 | 11,99 | |
| Veuf(ve) | 119 256 | 40 748 | 59 060 | 219 063 |
| | 2,49 | 0,85 | 1,23 | 4,57 |
| | 54,44 | 18,60 | 26,96 | |
| | 4,20 | 4,33 | 5,81 | |
| Seul(e) | 551 688 | 198 711 | 213 820 | 964 220 |
| | 11,51 | 4,15 | 4,46 | 20,12 |
| | 57,22 | 20,61 | 22,18 | |
| | 19,45 | 21,13 | 21,05 | |
| Total | 2 836 101 | 940 398 | 1 015 768 | 4 792 267 |
| | 59,18 | 19,62 | 21,20 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 318 100

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 88
Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus,
 Québec, 1987

| Âge | Niveau de détresse psychologique | | | | Total |
|-------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|----------------|
| | Faible (Q1-Q3) | Modéré (Quint 4) | Élevé (Quint 5) | Inconnu | |
| 15-19 | 249 528 | 110 249 | 123 701 | 3 252 | 486 730 |
| | 4,88 | 2,16 | 2,42 | 0,06 | 9,52 |
| | 51,27 | 22,65 | 25,41 | 0,67 | |
| | 8,60 | 11,48 | 11,83 | 1,61 | |
| 20-24 | 306 506 | 110 466 | 109 163 | 3 069 | 529 205 |
| | 6,00 | 2,16 | 2,14 | 0,06 | 10,36 |
| | 57,92 | 20,87 | 20,63 | 0,58 | |
| | 10,56 | 11,50 | 10,44 | 1,52 | |
| 25-29 | 362 126 | 105 240 | 110 903 | 3 349 | 581 618 |
| | 7,09 | 2,06 | 2,17 | 0,07 | 11,38 |
| | 62,26 | 18,09 | 19,07 | 0,58 | |
| | 12,48 | 10,96 | 10,60 | 1,66 | |
| 30-34 | 361 714 | 105 433 | 92 301 | 7 282 | 566 730 |
| | 7,08 | 2,06 | 1,81 | 0,14 | 11,09 |
| | 63,82 | 18,60 | 16,29 | 1,28 | |
| | 12,46 | 10,98 | 8,82 | 3,61 | |
| 35-39 | 350 017 | 100 435 | 111 790 | 6 412 | 568 654 |
| | 6,85 | 1,97 | 2,19 | 0,13 | 11,13 |
| | 61,55 | 17,66 | 19,66 | 1,13 | |
| | 12,06 | 10,46 | 10,69 | 3,18 | |
| 40-44 | 260 845 | 105 944 | 102 783 | 8 139 | 477 711 |
| | 5,10 | 2,07 | 2,01 | 0,16 | 9,35 |
| | 54,60 | 22,18 | 21,52 | 1,70 | |
| | 8,99 | 11,03 | 9,83 | 4,03 | |
| 45-49 | 217 372 | 72 985 | 82 181 | 13 222 | 385 760 |
| | 4,25 | 1,43 | 1,61 | 0,26 | 7,55 |
| | 56,35 | 18,92 | 21,30 | 3,43 | |
| | 7,49 | 7,60 | 7,86 | 6,55 | |
| 50-54 | 159 555 | 59 414 | 70 184 | 13 191 | 302 344 |
| | 3,12 | 1,16 | 1,37 | 0,26 | 5,92 |
| | 52,77 | 19,65 | 23,21 | 4,36 | |
| | 5,50 | 6,19 | 6,71 | 6,54 | |
| 55-59 | 176 258 | 53 818 | 69 908 | 20 492 | 320 476 |
| | 3,45 | 1,05 | 1,37 | 0,40 | 6,27 |
| | 55,00 | 16,79 | 21,81 | 6,39 | |
| | 6,07 | 5,60 | 6,68 | 10,16 | |
| 60-64 | 163 454 | 45 575 | 55 346 | 22 245 | 286 620 |
| | 3,20 | 0,89 | 1,08 | 0,44 | 5,61 |
| | 57,03 | 15,90 | 19,31 | 7,76 | |
| | 5,63 | 4,75 | 5,29 | 11,03 | |
| 65-69 | 131 174 | 43 250 | 48 897 | 29 739 | 253 059 |
| | 2,57 | 0,85 | 0,96 | 0,58 | 4,95 |
| | 51,84 | 17,09 | 19,32 | 11,75 | |
| | 4,52 | 4,50 | 4,67 | 14,74 | |

Tableau 88 (suite)
Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus,
 Québec, 1987

| Âge | Niveau de détresse psychologique | | | | Total |
|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | Faible (Q1-Q3) | Modéré (Quint 4) | Élevé (Quint 5) | Inconnu | |
| 70-74 | 85 093 | 21 791 | 28 375 | 30 418 | 165 677 |
| | 1,67 | 0,43 | 0,56 | 0,60 | 3,24 |
| | 51,36 | 13,15 | 17,13 | 18,36 | |
| | 2,93 | 2,27 | 2,71 | 15,08 | |
| 75-79 | 46 264 | 14 013 | 21 001 | 25 491 | 106 769 |
| | 0,91 | 0,27 | 0,41 | 0,50 | 2,09 |
| | 43,33 | 13,12 | 19,67 | 23,88 | |
| | 1,59 | 1,46 | 2,01 | 12,64 | |
| 80-84 | 25 465 | 7 938 | 12 149 | 12 740 | 58 292 |
| | 0,50 | 0,16 | 0,24 | 0,25 | 1,14 |
| | 43,69 | 13,62 | 20,84 | 21,86 | |
| | 0,88 | 0,83 | 1,16 | 6,32 | |
| 85-89 | 4 065 | 2 664 | 6 685 | 2 021 | 15 435 |
| | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,04 | 0,30 |
| | 26,33 | 17,26 | 43,31 | 13,10 | |
| | 0,14 | 0,28 | 0,64 | 1,00 | |
| 90-94 | 1 150 | 445 | 147 | 0 | 1 742 |
| | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 66,01 | 25,54 | 8,45 | 0,00 | |
| | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | |
| 95 et + | 1 555 | 802 | 510 | 678 | 3 544 |
| | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| | 43,86 | 22,62 | 14,39 | 19,14 | |
| | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,34 | |
| Total | 2 902 141 | 960 463 | 1 046 024 | 201 740 | 5 110 367 |
| | 56,79 | 18,79 | 20,47 | 3,95 | 100,00 |

Légende:
 population estimée
 pourcentage sur le total
 pourcentage sur la ligne
 pourcentage sur la colonne

Tableau 89
**Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus,
 Québec, 1987**

| Âge | Niveau de détresse psychologique | | | | | Inconnu | Total |
|-------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------------|
| | Quintile 1 | Quintile 2 | Quintile 3 | Quintile 4 | Quintile 5 | | |
| 15-19 | 81 436 | 67 062 | 101 031 | 110 249 | 123 701 | 3 252 | 486 730 |
| | 1,59 | 1,31 | 1,98 | 2,16 | 2,42 | 0,06 | 9,52 |
| | 16,73 | 13,78 | 20,76 | 22,65 | 25,41 | 0,67 | |
| | 8,38 | 7,43 | 9,83 | 11,48 | 11,83 | 1,61 | |
| 20-24 | 101 261 | 97 614 | 107 632 | 110 466 | 109 163 | 3 069 | 529 205 |
| | 1,98 | 1,91 | 2,11 | 2,16 | 2,14 | 0,06 | 10,36 |
| | 19,13 | 18,45 | 20,34 | 20,87 | 20,63 | 0,58 | |
| | 10,42 | 10,81 | 10,48 | 11,50 | 10,44 | 1,52 | |
| 25-29 | 114 753 | 119 872 | 127 501 | 105 240 | 110 903 | 3 349 | 581 618 |
| | 2,25 | 2,35 | 2,49 | 2,06 | 2,17 | 0,07 | 11,38 |
| | 19,73 | 20,61 | 21,92 | 18,09 | 19,07 | 0,58 | |
| | 11,81 | 13,28 | 12,41 | 10,96 | 10,60 | 1,66 | |
| 30-34 | 115 920 | 119 625 | 126 169 | 105 433 | 92 301 | 7 282 | 566 730 |
| | 2,27 | 2,34 | 2,47 | 2,06 | 1,81 | 0,14 | 11,09 |
| | 20,45 | 21,11 | 22,26 | 18,60 | 16,29 | 1,28 | |
| | 11,93 | 13,25 | 12,28 | 10,98 | 8,82 | 3,61 | |
| 35-39 | 121 610 | 108 762 | 119 645 | 100 435 | 111 790 | 6 412 | 568 654 |
| | 2,38 | 2,13 | 2,34 | 1,97 | 2,19 | 0,13 | 11,13 |
| | 21,39 | 19,13 | 21,04 | 17,66 | 19,66 | 1,13 | |
| | 12,51 | 12,04 | 11,65 | 10,46 | 10,69 | 3,18 | |
| 40-44 | 89 659 | 74 043 | 97 143 | 105 944 | 102 783 | 8 139 | 477 711 |
| | 1,75 | 1,45 | 1,90 | 2,07 | 2,01 | 0,16 | 9,35 |
| | 18,77 | 15,50 | 20,34 | 22,18 | 21,52 | 1,70 | |
| | 9,23 | 8,20 | 9,46 | 11,03 | 9,83 | 4,03 | |
| 45-49 | 70 351 | 71 232 | 75 789 | 72 985 | 82 181 | 13 222 | 385 760 |
| | 1,38 | 1,39 | 1,48 | 1,43 | 1,61 | 0,26 | 7,55 |
| | 18,24 | 18,47 | 19,65 | 18,92 | 21,30 | 3,43 | |
| | 7,24 | 7,89 | 7,38 | 7,60 | 7,86 | 6,55 | |
| 50-54 | 53 863 | 51 410 | 54 282 | 59 414 | 70 184 | 13 191 | 302 344 |
| | 1,05 | 1,01 | 1,06 | 1,16 | 1,37 | 0,26 | 5,92 |
| | 17,82 | 17,00 | 17,95 | 19,65 | 23,21 | 4,36 | |
| | 5,54 | 5,69 | 5,28 | 6,19 | 6,71 | 6,54 | |
| 55-59 | 66 177 | 52 571 | 57 511 | 53 818 | 69 908 | 20 492 | 320 476 |
| | 1,29 | 1,03 | 1,13 | 1,05 | 1,37 | 0,40 | 6,27 |
| | 20,65 | 16,40 | 17,95 | 16,79 | 21,81 | 6,39 | |
| | 6,81 | 5,82 | 5,60 | 5,60 | 6,68 | 10,16 | |
| 60-64 | 55 611 | 47 855 | 59 987 | 45 5751 | 55 346 | 22 245 | 286 620 |
| | 1,09 | 0,94 | 1,17 | 0,89 | 1,08 | 0,44 | 5,61 |
| | 19,40 | 16,70 | 20,93 | 15,90 | 19,31 | 7,76 | |
| | 5,72 | 5,30 | 5,84 | 4,75 | 5,29 | 11,03 | |
| 65-69 | 43 494 | 41 434 | 46 247 | 43 250 | 48 897 | 29 739 | 253 059 |
| | 0,85 | 0,81 | 0,90 | 0,85 | 0,96 | 0,58 | 4,95 |
| | 17,19 | 16,37 | 18,27 | 17,09 | 19,32 | 11,75 | |
| | 4,48 | 4,59 | 4,50 | 4,50 | 4,67 | 14,74 | |

Tableau 89 (suite)
 Détresse psychologique*, selon l'âge, population âgée de 15 ans et plus,
 Québec, 1987

| Âge | Niveau de détresse psychologique | | | | | Inconnu | Total |
|--------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Quintile 1 | Quintile 2 | Quintile 3 | Quintile 4 | Quintile 5 | | |
| 70-74 | 28 842 | 32 393 | 23 858 | 21 791 | 28 375 | 30 418 | 165 677 |
| | 0,56 | 0,63 | 0,47 | 0,43 | 0,56 | 0,60 | 3,24 |
| | 17,41 | 19,55 | 14,40 | 13,15 | 17,13 | 18,36 | |
| | 2,97 | 3,59 | 2,32 | 2,27 | 2,71 | 15,08 | |
| 75-79 | 17 139 | 10 130 | 18 995 | 14 013 | 21 001 | 25 491 | 106 769 |
| | 0,34 | 0,20 | 0,37 | 0,27 | 0,41 | 0,50 | 2,09 |
| | 16,05 | 9,49 | 17,79 | 13,12 | 19,67 | 23,88 | |
| | 1,76 | 1,12 | 1,85 | 1,46 | 2,01 | 12,64 | |
| 80-84 | 9 766 | 6 746 | 8 953 | 7 938 | 12 149 | 12 740 | 58 292 |
| | 0,19 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,24 | 0,25 | 1,14 |
| | 16,75 | 11,57 | 15,36 | 13,62 | 20,84 | 21,86 | |
| | 1,00 | 0,75 | 0,87 | 0,83 | 1,16 | 6,32 | |
| 85-89 | 778 | 1 578 | 1 709 | 2 664 | 6 685 | 2 021 | 15 435 |
| | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,04 | 0,30 |
| | 5,04 | 10,22 | 11,07 | 17,26 | 43,31 | 13,10 | |
| | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,28 | 0,64 | 1,00 | |
| 90-94 | 541 | 0 | 608 | 445 | 147 | 0 | 1 742 |
| | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 31,08 | 0,00 | 34,93 | 25,54 | 8,45 | 0,00 | |
| | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | |
| 95 et + | 640 | 640 | 275 | 802 | 510 | 678 | 3 544 |
| | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| | 18,05 | 18,05 | 7,77 | 22,62 | 14,39 | 19,14 | |
| | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,34 | |
| Total | 971 842 | 902 966 | 1 027 333 | 960 463 | 1 046 024 | 201 740 | 5 110 367 |
| | 19,02 | 17,67 | 20,10 | 18,79 | 20,47 | 3,95 | 100,00 |

Légende:
 population estimée
 pourcentage sur le total
 pourcentage sur la ligne
 pourcentage sur la colonne

Tableau 90
Détresse psychologique*, selon l'indice d'événements stressants*, population
 âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Événements stressants | Niveau de détresse psychologique | | | Total |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | Faible (Q1-Q3) | Modéré (Quint4) | Élevé (Quint5) | |
| Aucun événement | 1 691 343 | 470 956 | 452 582 | 2 614 881 |
| | 35,15 | 9,79 | 9,41 | 154,34 |
| | 64,68 | 18,01 | 17,31 | |
| | 59,41 | 49,99 | 44,25 | |
| Faible | 662 450 | 223 401 | 191 014 | 1 076 865 |
| | 13,77 | 4,64 | 3,97 | 22,38 |
| | 61,52 | 20,75 | 17,74 | |
| | 23,27 | 23,71 | 18,67 | |
| Moyen | 288 999 | 131 640 | 165 061 | 585 700 |
| | 6,01 | 2,74 | 3,43 | 12,17 |
| | 49,34 | 22,48 | 28,18 | |
| | 10,15 | 13,97 | 16,14 | |
| Élevé | 204 158 | 116 147 | 214 201 | 534 506 |
| | 4,24 | 2,41 | 4,45 | 11,11 |
| | 38,20 | 21,73 | 40,07 | |
| | 7,17 | 12,33 | 20,94 | |
| Total | 2 846 950 | 942 144 | 1 022 857 | 4 811 952 |
| | 59,16 | 19,58 | 21,26 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 291 551

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 91
Détresse psychologique*, selon la satisfaction face à la vie sociale, population
 âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Satisfaction face à la vie sociale | Niveau de détresse psychologique | | | Total |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | Faible (Q1-Q3) | Modéré (Quint4) | Élevé (Quint5) | |
| Très satisfaisante | 1 183 092 | 229 460 | 161 745 | 1 574 297 |
| | 24,25 | 4,70 | 3,32 | 32,27 |
| | 75,15 | 14,58 | 10,27 | |
| | 41,05 | 24,04 | 15,52 | |
| Plutôt satisfaisante | 1 550 944 | 611 839 | 626 320 | 2 789 103 |
| | 31,79 | 12,54 | 12,84 | 57,17 |
| | 55,61 | 21,94 | 22,46 | |
| | 53,81 | 64,09 | 60,11 | |
| Insatisfaisante | 147 956 | 113 291 | 253 973 | 515 220 |
| | 3,03 | 2,32 | 5,21 | 10,56 |
| | 28,72 | 21,99 | 49,29 | |
| | 5,13 | 11,87 | 24,37 | |
| Total | 2 881 993 | 954 590 | 1 042 038 | 4 878 621 |
| | 59,07 | 19,57 | 21,36 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 231 746

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 92
Détresse psychologique*, selon l'indice de santé globale*, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Indice de santé globale | Niveau de détresse psychologique | | | Total |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Faible (Q1-Q3) | Modéré (Quint4) | Élevé (Quint5) | |
| Incapacité sévère | 68 882 | 37 987 | 112 306 | 219 175 |
| | 1,41 | 0,78 | 2,30 | 4,50 |
| | 31,43 | 17,33 | 51,24 | |
| | 2,39 | 4,00 | 10,84 | |
| Incapacité restreinte | 63 365 | 27 135 | 61 485 | 151 984 |
| | 1,30 | 0,56 | 1,26 | 3,12 |
| | 41,69 | 17,85 | 40,45 | |
| | 2,19 | 2,86 | 5,93 | |
| Problème chronique lourd | 353 891 | 166 810 | 220 291 | 740 992 |
| | 7,26 | 3,42 | 4,52 | 15,21 |
| | 47,76 | 22,51 | 29,73 | |
| | 12,26 | 17,57 | 21,26 | |
| Problème chronique léger | 665 208 | 237 849 | 225 143 | 1 128 200 |
| | 13,65 | 4,88 | 4,62 | 23,15 |
| | 58,96 | 21,08 | 19,96 | |
| | 23,04 | 25,05 | 21,73 | |
| Symptomatique | 338 388 | 119 201 | 119 652 | 577 241 |
| | 6,94 | 2,45 | 2,46 | 11,85 |
| | 58,62 | 20,65 | 20,73 | |
| | 11,72 | 12,55 | 11,55 | |
| Aucune maladie | 1 397 092 | 360 622 | 297 243 | 2 054 956 |
| | 28,67 | 7,40 | 6,10 | 42,17 |
| | 67,99 | 17,55 | 14,46 | |
| | 48,40 | 37,98 | 28,69 | |
| Total | 2 886 826 | 949 604 | 1 036 119 | 4 872 549 |
| | 59,25 | 19,49 | 21,26 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 237 819

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 93
**Détresse psychologique*, selon la scolarité*, population âgée de 15 ans et plus,
 Québec, 1987**

| Scolarité | Niveau de détresse psychologique | | | Total |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | Faible (Q1-Q3) | Modéré (Quint4) | Élevé (Quint5) | |
| Quintile 1 | 460 266 | 160 282 | 220 719 | 841 267 |
| | 9,52 | 3,32 | 4,57 | 17,40 |
| | 54,71 | 19,05 | 26,24 | |
| | 16,12 | 16,86 | 21,46 | |
| Quintile 2 | 526 896 | 177 951 | 187 713 | 892 560 |
| | 10,90 | 3,68 | 3,88 | 18,46 |
| | 59,03 | 19,94 | 21,03 | |
| | 18,45 | 18,72 | 18,25 | |
| Quintile 3 | 541 078 | 179 437 | 206 714 | 927 229 |
| | 11,19 | 3,71 | 4,28 | 19,18 |
| | 58,35 | 19,35 | 22,29 | |
| | 18,95 | 18,88 | 20,10 | |
| Quintile 4 | 637 490 | 206 807 | 199 092 | 1 043 389 |
| | 13,19 | 4,28 | 4,12 | 21,58 |
| | 61,10 | 19,82 | 19,08 | |
| | 22,33 | 21,76 | 19,36 | |
| Quintile 5 | 689 709 | 226 127 | 214 154 | 1 129 989 |
| | 14,27 | 4,68 | 4,43 | 23,37 |
| | 61,04 | 20,01 | 18,95 | |
| | 24,15 | 23,79 | 20,82 | |
| Total | 2 855 439 | 950 604 | 1 028 391 | 4 834 435 |
| | 59,06 | 19,66 | 21,27 | 100,00 |

Valeurs manquantes = 275 933

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Chapitre 6

Perception de l'état de santé des Québécois

Tableau 94 a

Probabilité moyenne standardisée de l'indice de santé globale*, selon la perception de l'état de santé et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Perception de l'état de santé | Sexe | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Intervalle de confiance | | Intervalle de confiance | | Intervalle de confiance | |
| | H | à 95 % | F | à 95 % | Total | à 95 % |
| Excellente | 0,378 | +0,006 | 0,400 | +0,005 | 0,390 | +0,005 |
| Très bonne | 0,416 | +0,005 | 0,488 | +0,005 | 0,452 | +0,003 |
| Bonne | 0,505 | +0,006 | 0,585 | +0,005 | 0,546 | +0,004 |
| Moyenne ou mauvaise | 0,665 | +0,009 | 0,731 | +0,008 | 0,699 | +0,006 |

Tableau 94 b

Probabilité moyenne de l'indice de santé globale*, selon la perception de l'état de santé, l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus, Québec, 1987

| Âge | Perception de l'état de santé | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Excellente | | | Très bonne | | | Bonne | | | Moyenne ou mauvaise | | | Total | | |
| | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total | H | F | Total |
| 15-24 | 0,340 | 0,389 | 0,358 | 0,380 | 0,434 | 0,407 | 0,435 | 0,482 | 0,462 | 0,506 | 0,610 | 0,570 | 0,384 | 0,449 | 0,416 |
| 25-44 | 0,371 | 0,386 | 0,378 | 0,401 | 0,425 | 0,439 | 0,479 | 0,574 | 0,528 | 0,640 | 0,710 | 0,676 | 0,431 | 0,500 | 0,466 |
| 45-64 | 0,376 | 0,402 | 0,388 | 0,428 | 0,494 | 0,462 | 0,537 | 0,626 | 0,584 | 0,777 | 0,806 | 0,793 | 0,512 | 0,587 | 0,551 |
| 65 et + | 0,492 | 0,459 | 0,473 | 0,519 | 0,596 | 0,558 | 0,681 | 0,688 | 0,685 | 0,825 | 0,830 | 0,828 | 0,651 | 0,630 | 0,668 |
| Total | 0,368 | 0,396 | 0,381 | 0,411 | 0,478 | 0,445 | 0,514 | 0,591 | 0,556 | 0,734 | 0,775 | 0,756 | 0,464 | 0,536 | 0,501 |

Tableau 95
 Perception de l'état de santé, selon l'âge et le sexe, population âgée de 15 ans et plus,
 Québec, 1987

| Âge | Sexe | Perception de l'état de santé | | | | | | | | Total | |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Excellente | | Très bonne | | Bonne | | Moyenne ou mauvaise | | N | % |
| | | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Total | Total | 948 432 | 18,7 | 2 070 367 | 40,8 | 1 476 831 | 29,1 | 578 184 | 11,4 | 5 073 813 | 100 |
| | H | 526 119 | 21,4 | 1 006 847 | 40,9 | 670 947 | 27,3 | 527 208 | 10,5 | 2 461 121 | 100 |
| | F | 422 313 | 16,2 | 1 063 520 | 40,7 | 805 884 | 30,8 | 320 976 | 12,3 | 2 612 913 | 100 |
| 15 à 24 | Total | 244 228 | 24,1 | 467 645 | 46,2 | 255 873 | 25,3 | 44 172 | 4,4 | 1 011 919 | 100 |
| | H | 155 767 | 30,5 | 229 297 | 44,8 | 109 217 | 21,4 | 17 266 | 3,4 | 511 548 | 100 |
| | F | 88 460 | 17,7 | 238 349 | 47,6 | 146 656 | 29,3 | 26 906 | 5,4 | 500 371 | 100 |
| 25 à 44 | Total | 454 483 | 20,8 | 1 010 487 | 46,3 | 574 896 | 26,3 | 143 412 | 6,6 | 2 183 277 | 100 |
| | H | 242 795 | 22,5 | 485 627 | 45,0 | 281 335 | 26,1 | 70 323 | 6,5 | 1 080 080 | 100 |
| | F | 211 688 | 19,2 | 524 860 | 47,6 | 293 561 | 26,6 | 73 088 | 6,6 | 1 103 197 | 100 |
| 46 à 64 | Total | 187 421 | 14,6 | 443 877 | 34,6 | 425 273 | 33,1 | 228 180 | 17,8 | 1 284 751 | 100 |
| | H | 102 086 | 16,4 | 218 815 | 35,3 | 197 925 | 31,9 | 101 955 | 16,4 | 620 780 | 100 |
| | F | 85 335 | 12,9 | 225 063 | 33,9 | 227 348 | 34,2 | 126 225 | 19,0 | 663 971 | 100 |
| 65 et + | Total | 62 300 | 10,5 | 148 358 | 25,0 | 220 789 | 37,2 | 162 419 | 27,4 | 593 866 | 100 |
| | H | 25 471 | 10,2 | 73 109 | 29,4 | 82 470 | 33,2 | 67 663 | 27,2 | 248 713 | 100 |
| | F | 36 829 | 10,7 | 75 249 | 21,8 | 138 319 | 40,1 | 94 757 | 27,5 | 345 154 | 100 |

N = population estimée

Chapitre 7

Problèmes sociaux

Tableau 96
Problèmes rapportés par un tiers —
Distribution de l'échantillon selon le sexe, l'état matrimonial et l'âge, Québec, 1987

| No. des cartes | Sexe | État matrimonial | Âge | Fréquence attendue (selon distribution des cartes) | Fréquence obtenue (échantillon) | Fréquence dans la population du Québec (recensement) | |
|----------------|------|------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | 1981 | 1986 ¹ |
| 1-6 | H | célibataire | 15-24 | 11,8 | 13,5 | 10,9 | 9,2 |
| 7 | H | marié | 15-24 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| 8 | H | célibataire | 25-34 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
| 9-12 | H | marié | 25-34 | 7,8 | 8,2 | 8,0 | 7,4 |
| 13-16 | H | marié | 35-44 | 7,8 | 7,5 | 6,8 | 7,5 |
| 17-19 | H | marié | 45-54 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
| 20-21 | H | marié | 55-64 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 4,5 |
| 22 | H | marié | 65-69 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | — |
| 23 | H | marié | 70 et + | 2,0 | 1,4 | 2,9 | 3,4 |
| 24 | H | célibataire | 35 et + | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,6 |
| 25 | H | séparé-divorcé | 25 et + | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,4 |
| 26-29 | F | célibataire | 15-24 | 7,8 | 8,0 | 9,0 | — |
| 47 | F | célibataire | 25-34 | 2,0 | 11,8 | 12,2 | 11,9 |
| 44 | F | célibataire | 15-44 ² | 2,0 | 2,3 | — | — |
| 30 | F | mariée | 15-44 ² | 2,0 | 17,7 | 18,2 | 18,2 |
| 31 | F | mariée | 15-24 | 2,0 | 1,8 | 3,2 | 17,7 |
| 32-35 | F | mariée | 25-34 | 7,8 | 8,3 | 8,5 | — |
| 36-38 | F | mariée | 35-44 | 5,9 | 5,5 | 6,5 | — |
| 39-41 | F | mariée | 45-54 | 5,9 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
| 42-43 | F | mariée | 55-64 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 4,1 |
| 45 | F | mariée | 65 et + | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 2,7 |
| 46 | F | veuve | 70 et + | 2,0 | 2,1 | 2,3 | — |
| 48 et 50 | F | séparée-divorcée | 25 et + | 3,9 | 4,9 | 2,6 | 3,5 |
| 49 | F | célibataire | 45 et + | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 2,2 |
| 51 | F | veuve | 55-69 | 2,0 | 2,6 | 1,8 | — |

¹ La population selon le recensement de 1986 est donnée à titre indicatif.

² Catégorie résiduelle

PARTIE 3

Les conséquences

Chapitre 8

Incapacité

8.1

Incapacité

Tableau 97
Cause principale de l'incapacité à long terme, selon le sexe et l'âge, en pourcentage, Québec, 1987

| Âge/Sexe | Total | Ostéo-articulaire | Cardio-vasculaire | Accidentelle | Respiratoire | Mentale | Malaise, etc. | Vision | Diabète | Digestif | Audition | Autres |
|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Total | 100,0 | 26,0 | 15,8 | 10,7 | 7,2 | 5,3 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 25,7 |
| 0-14 | 100,0 | 10,8 | 5,8 | 2,5 | 29,6 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 4,6 | 40,6 |
| 15-24 | 100,0 | 20,1 | 1,5 | 29,0 | 9,2 | 7,6 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 2,4 | 26,4 |
| 25-44 | 100,0 | 29,3 | 6,0 | 17,8 | 3,0 | 8,2 | 5,0 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 26,0 |
| 45-64 | 100,0 | 32,4 | 20,8 | 9,2 | 4,3 | 5,7 | 1,7 | 0,4 | 2,9 | 2,0 | 1,1 | 19,4 |
| 65-74 | 100,0 | 14,4 | 32,0 | 3,5 | 9,8 | 1,8 | 1,3 | 4,6 | 2,8 | 3,4 | 0,2 | 26,1 |
| 75 et + | 100,0 | 29,9 | 15,9 | 4,3 | 2,0 | 2,8 | 1,1 | 7,3 | 2,1 | 1,2 | 0,0 | 33,3 |
| H | 100,0 | 22,5 | 17,5 | 13,8 | 8,9 | 4,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 24,8 |
| 0-14 | 100,0 | 7,9 | 3,8 | 3,6 | 33,5 | 3,6 | 0,2 | 1,0 | 2,3 | 1,2 | 6,5 | 36,4 |
| 15-25 | 100,0 | 18,6 | 1,1 | 44,1 | 8,8 | 8,2 | 0,5 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 13,8 |
| 25-44 | 100,0 | 31,1 | 5,8 | 24,3 | 2,7 | 5,5 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 24,6 |
| 45-64 | 100,0 | 28,3 | 23,2 | 11,7 | 4,0 | 4,5 | 1,5 | 0,3 | 2,5 | 2,0 | 1,3 | 20,8 |
| 65-74 | 100,0 | 6,9 | 36,2 | 1,8 | 14,2 | 0,4 | 2,3 | 4,6 | 2,8 | 2,6 | 0,3 | 27,7 |
| 75 et + | 100,0 | 19,6 | 25,6 | 3,8 | 5,9 | 3,3 | 0,4 | 7,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 31,5 |
| F | 100,0 | 29,2 | 14,2 | 7,8 | 5,7 | 6,3 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 26,2 |
| 0-14 | 100,0 | 14,7 | 8,6 | 1,0 | 24,2 | 0,5 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 46,3 |
| 15-25 | 100,0 | 21,0 | 1,7 | 18,9 | 9,4 | 7,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,7 | 34,8 |
| 25-44 | 100,0 | 27,4 | 6,3 | 11,2 | 3,3 | 10,8 | 8,1 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 2,3 | 27,5 |
| 45-64 | 100,0 | 36,3 | 18,6 | 6,9 | 4,6 | 6,8 | 2,0 | 0,6 | 3,3 | 2,1 | 0,9 | 18,1 |
| 65-74 | 100,0 | 21,6 | 27,9 | 5,1 | 5,5 | 3,3 | 0,4 | 4,7 | 2,9 | 4,2 | 0,0 | 24,5 |
| 75 et + | 100,0 | 34,4 | 11,7 | 4,6 | 0,4 | 2,6 | 1,4 | 7,1 | 3,0 | 0,9 | 0,0 | 34,0 |

Note: Ostéo-articulaire comprend arthrite, rhumatisme, mal de dos et autres ostéo-articulaires. Cardio-vasculaire comprend hypertension et maladie cardiaque. Accidentelle comprend lésions accidentelles. Respiratoire comprend affections respiratoires aiguës, influenza, bronchite, emphysème et asthme. Mentale comprend troubles mentaux. Malaise, etc. comprend maux de tête, malaise et fatigue. Vision comprend troubles de vision. Diabète comprend diabète. Digestif comprend ulcère gastrique et duodénum, troubles digestifs et autres digestifs. Audition comprend troubles d'audition. Autres comprend troubles de la thyroïde, anémie, rhume des foins, allergies, troubles de dentition, allergies et affections cutanées, problèmes génitaux féminins et autres.

Chapitre 10

Recours aux services et consommation de médicaments

10.1

Recours aux services

Tableau 98

Nombre d'hospitalisations au cours des 12 derniers mois, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités, Québec, 1987

| | Incapacité quelconque | Pas d'incapacité | Total |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 hospitalisation | 129 925 | 151 775 | 281 699 |
| | 3,31 | 3,87 | 7,18 |
| | 46,12 | 53,88 | |
| | 12,00 | 5,34 | |
| 2 hospitalisations | 30 766 | 34 831 | 65 597 |
| | 0,78 | 0,89 | 1,67 |
| | 46,90 | 53,10 | |
| | 2,84 | 1,23 | |
| 3 hospitalisations et + | 9 748 | 3 612 | 13 359 |
| | 0,25 | 0,09 | 0,34 |
| | 72,97 | 27,03 | |
| | 0,90 | 0,13 | |
| Aucune hospitalisation | 912 053 | 2 649 998 | 3 562 052 |
| | 23,25 | 67,56 | 90,81 |
| | 25,60 | 74,40 | |
| | 84,25 | 93,30 | |
| Total | 1 082 492 | 2 840 215 | 3 922 707 |
| | 27,60 | 72,40 | 100,00 |

Légende :

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 99
Consultation de professionnels de la santé, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités et le type de professionnels consultés, Québec, 1987

| Type de professionnel | Incapacité quelconque | Pas d'incapacité | Total |
|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| Généraliste | 118 824 | 542 576 | 661 400 |
| | 6,54 | 29,86 | 36,40 |
| | 17,97 | 82,03 | |
| | 33,13 | 37,21 | |
| Dentiste | 21 357 | 275 251 | 296 608 |
| | 1,18 | 15,15 | 16,33 |
| | 7,20 | 92,80 | |
| | 5,95 | 18,88 | |
| Infirmière | 24 613 | 51 729 | 76 342 |
| | 1,35 | 2,85 | 4,20 |
| | 32,24 | 67,76 | |
| | 6,86 | 3,55 | |
| Pharmacien | 42 427 | 123 775 | 166 202 |
| | 2,34 | 6,81 | 9,15 |
| | 25,53 | 74,47 | |
| | 11,83 | 8,49 | |
| Optométriste | 10 997 | 91 031 | 102 027 |
| | 0,61 | 5,01 | 5,62 |
| | 10,78 | 89,22 | |
| | 3,07 | 6,24 | |
| Physiothérapeute | 17 715 | 23 113 | 40 828 |
| | 0,98 | 1,27 | 2,25 |
| | 43,39 | 56,61 | |
| | 4,94 | 1,59 | |
| Chiropraticien | 9 004 | 49 510 | 58 514 |
| | 0,50 | 2,73 | 3,22 |
| | 15,39 | 84,61 | |
| | 2,51 | 3,40 | |
| Psychologue ou tr. social | 13 914 | 27 704 | 41 618 |
| | 0,77 | 1,52 | 2,29 |
| | 33,43 | 66,57 | |
| | 3,88 | 1,90 | |
| Cardiologue | 12 284 | 16 663 | 28 947 |
| | 0,68 | 0,92 | 1,59 |
| | 42,44 | 57,56 | |
| | 3,42 | 1,14 | |
| Chirurgien orthopéd. | 12 271 | 14 894 | 27 164 |
| | 0,68 | 0,82 | 1,50 |
| | 45,17 | 54,83 | |
| | 3,42 | 1,02 | |
| Gynécologue obstétricien | 3 960 | 42 196 | 46 156 |
| | 0,22 | 2,32 | 2,54 |
| | 8,58 | 91,42 | |
| | 1,10 | 2,89 | |

Tableau 99 (suite)

Consultation de professionnels de la santé, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités et le type de professionnels consultés, Québec, 1987

| Type de professionnel | Incapacité quelconque | Pas d'incapacité | Total |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Pédiatre | 3 135 | 32 679 | 35 814 |
| | 0,17 | 1,80 | 1,97 |
| | 8,75 | 91,25 | |
| | 0,87 | 2,24 | |
| Psychiatre | 4 901 | 5 666 | 10 567 |
| | 0,27 | 0,31 | 0,58 |
| | 46,38 | 53,62 | |
| | 1,37 | 0,39 | |
| Autres | 63 277 | 161 425 | 224 702 |
| | 3,48 | 8,88 | 12,37 |
| | 28,16 | 71,84 | |
| | 17,64 | 11,07 | |
| Total | 358 680 | 1 458 210 | 1 816 889 |
| | 19,74 | 80,26 | 100,00 |

Légende:

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 100

Personnes qui ont consulté au moins 1 fois au cours des 2 dernières semaines, selon le type de professionnel, l'âge et le sexe, Québec, 1987

| Âge | sexe | Type de professionnel | | | | | | | |
|---------------|------|-----------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | Médecin général. | Dentiste Denturol. | Infirmière | Pharmacien | Optomét. Opticien | Physiothérap. | Chiro-praticien | Psychol. Trav. soc. |
| 0-14 | H | 60 280 | 51 440 | 8 147 | 12 436 | 4 963 | 1 729 | 1 783 | 4 539 |
| | % | 8,8 | 7,5 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| | F | 51 489 | 46 763 | 8 183 | 15 064 | 7 738 | 1 421 | 2 049 | 4 951 |
| | % | 7,9 | 7,2 | 1,3 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| 15-24 | H | 32 282 | 22 691 | 2 255 | 5 990 | 8 112 | 2 116 | 2 194 | 2 712 |
| | % | 6,3 | 4,4 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| | F | 46 006 | 22 543 | 5 665 | 13 107 | 8 861 | 1 704 | 2 726 | 2 105 |
| | % | 9,2 | 4,5 | 1,1 | 2,6 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| 25-44 | H | 76 851 | 40 943 | 6 958 | 17 398 | 15 045 | 10 791 | 13 388 | 6 199 |
| | % | 7,1 | 3,8 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 0,6 |
| | F | 125 329 | 54 849 | 11 860 | 32 464 | 20 248 | 7 129 | 18 739 | 8 866 |
| | % | 11,3 | 4,9 | 1,1 | 2,9 | 1,8 | 0,6 | 1,7 | 0,8 |
| 45-64 | H | 61 026 | 14 993 | 5 113 | 15 006 | 9 133 | 4 594 | 5 047 | 2 772 |
| | % | 9,7 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,4 |
| | F | 95 615 | 24 084 | 9 076 | 27 576 | 14 485 | 6 225 | 7 757 | 3 142 |
| | % | 14,3 | 3,6 | 1,4 | 4,1 | 2,2 | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
| 65-74 | H | 25 866 | 6 568 | 2 046 | 6 404 | 3 367 | 1 024 | 489 | 1 244 |
| | % | 14,8 | 3,8 | 1,2 | 3,7 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
| | F | 43 141 | 7 037 | 5 535 | 10 298 | 5 452 | 2 763 | 2 589 | 2 041 |
| | % | 18,6 | 3,0 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
| 75 et + | H | 15 942 | 1 733 | 2 436 | 3 513 | 1 013 | 919 | 893 | 125 |
| | % | 20,2 | 2,2 | 3,1 | 4,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,2 |
| | F | 28 114 | 2 964 | 9 593 | 7 489 | 3 873 | 413 | 869 | 2 922 |
| | % | 23,5 | 2,5 | 8,0 | 6,3 | 3,2 | 0,3 | 0,7 | 2,4 |
| Tous les âges | H | 272 246 | 138 368 | 26 954 | 60 747 | 41 633 | 21 173 | 23 785 | 17 592 |
| | % | 8,6 | 4,4 | 0,9 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| | F | 389 695 | 158 240 | 49 913 | 105 996 | 60 657 | 19 655 | 34 729 | 24 026 |
| | % | 11,9 | 4,8 | 1,5 | 3,2 | 1,8 | 0,6 | 1,1 | 0,7 |

Tableau 101

Personnes qui ont consulté au moins 1 fois au cours des 2 dernières semaines, selon le type de professionnel et le niveau de revenu*, Québec, 1987

| Niveau de revenu | | Type de professionnel | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | Médecin général. | Dentiste Denturol. | Infirmière | Pharmacien | Optomét. Opticien | Physiothérap. | Chiro-praticien | Psychol. Trav. soc. |
| Très pauvre | N | 71 888 | 29 135 | 6 798 | 16 358 | 5 816 | 3 925 | 1 601 | 6 107 |
| | % | 12,6 | 5,1 | 1,2 | 2,9 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,1 |
| Pauvre | N | 106 075 | 28 081 | 16 684 | 28 161 | 14 617 | 4 682 | 6 583 | 8 397 |
| | % | 11,5 | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| Revenu moyen | N | 309 216 | 142 764 | 25 902 | 77 422 | 47 788 | 18 360 | 29 029 | 17 161 |
| | % | 10,2 | 4,7 | 0,8 | 2,5 | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
| Riche | N | 105 429 | 73 080 | 17 688 | 31 148 | 23 626 | 9 152 | 17 501 | 6 013 |
| | % | 8,6 | 6,0 | 1,4 | 2,5 | 1,9 | 0,7 | 1,4 | 0,5 |

N = population estimée

Type de professionnel

| Âge | sexe | Type de professionnel | | | | | | Aucune consult. | Popul. estimée |
|---------------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Cardiologue | Chir. orthop. | Gynécologue | Pédiatre | Psychiatre | Autres | | |
| 0-14 | H | 516 | 682 | 0 | 15 501 | 364 | 15 374 | 533 924 | 684 470 |
| | % | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 0,1 | 2,2 | 78,0 | 100,0 |
| | F | 918 | 2 566 | 321 | 19 194 | 0 | 10 044 | 507 989 | 649 527 |
| | % | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 78,2 | 100,0 |
| 15-24 | H | 0 | 1 780 | 0 | 336 | 0 | 6 887 | 440 502 | 513 593 |
| | % | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 85,8 | 100,0 |
| | F | 623 | 976 | 5 979 | 1 308 | 278 | 12 561 | 401 291 | 502 342 |
| | % | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | 79,9 | 100,0 |
| 25-44 | H | 850 | 5 041 | 0 | 0 | 1 323 | 27 722 | 910 354 | 1 086 271 |
| | % | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,6 | 83,8 | 100,0 |
| | F | 1 261 | 4 904 | 29 993 | 0 | 4 702 | 45 059 | 836 581 | 1 108 105 |
| | % | 0,1 | 0,4 | 2,7 | 0,0 | 0,4 | 4,1 | 75,5 | 100,0 |
| 45-64 | H | 9 180 | 3 856 | 0 | 0 | 994 | 24 937 | 504 158 | 625 916 |
| | % | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 80,1 | 100,0 |
| | F | 5 080 | 6 069 | 8 135 | 0 | 1 834 | 42 026 | 482 721 | 669 285 |
| | % | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 6,3 | 72,1 | 100,0 |
| 65-74 | H | 2 645 | 401 | 0 | 0 | 391 | 10 419 | 127 752 | 174 293 |
| | % | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 6,0 | 73,3 | 100,0 |
| | F | 4 482 | 682 | 2 002 | 0 | 682 | 17 180 | 155 459 | 231 687 |
| | % | 1,9 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 7,4 | 67,1 | 100,0 |
| 75 et + | H | 2 532 | 207 | 0 | 0 | 0 | 4 568 | 53 087 | 78 991 |
| | % | 3,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 67,2 | 100,0 |
| | F | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 923 | 77 467 | 119 546 |
| | % | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 64,8 | 100,0 |
| Tous les âges | H | 15 722 | 11 967 | 0 | 15 836 | 3 072 | 89 907 | 2 569 776 | 3 163 536 |
| | % | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 2,8 | 81,2 | 100,0 |
| | F | 13 224 | 15 197 | 46 360 | 20 503 | 7 495 | 134 794 | 2 461 508 | 3 280 492 |
| | % | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 4,1 | 75,0 | 100,0 |

Type de professionnel

| Niveau de revenu | | Type de professionnel | | | | | | Aucune consult. | Population estimée |
|------------------|---|-----------------------|---------------|-------------|----------|------------|---------|-----------------|--------------------|
| | | Cardiologue | Chir. orthop. | Gynécologue | Pédiatre | Psychiatre | Autres | | |
| Très pauvre | N | 2 666 | 1 334 | 3 515 | 4 439 | 773 | 16 960 | 436 048 | 571 186 |
| | % | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 3,0 | 76,3 | 100,0 |
| Pauvre | N | 3 997 | 5 417 | 4 457 | 4 254 | 2 694 | 33 700 | 718 186 | 925 225 |
| | % | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 3,6 | 77,6 | 100,0 |
| Revenu moyen | N | 12 539 | 12 837 | 25 324 | 16 078 | 4 981 | 103 679 | 2 384 291 | 3 044 465 |
| | % | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 3,4 | 78,3 | 100,0 |
| Riche | N | 3 997 | 6 230 | 8 365 | 8 459 | 1 577 | 45 303 | 943 154 | 1 221 369 |
| | % | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 3,7 | 77,2 | 100,0 |

Tableau 102

Lieu de consultation, selon la présence ou l'absence de limitation dans les activités, Québec, 1987

| Lieu de consultation | Incapacité quelconque | Pas d'incapacité | Inconnu | Total |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|
| Bureau privé | 116 641 | 810 687 | 262 | 927 590 |
| | 8,40 | 58,40 | 0,02 | 66,82 |
| | 12,57 | 87,40 | 0,03 | |
| | 51,54 | 69,88 | 14,15 | |
| CLSC ou Centre de santé | 10 900 | 69 264 | 526 | 80 689 |
| | 0,79 | 4,99 | 0,04 | 5,81 |
| | 13,51 | 85,84 | 0,65 | |
| | 4,82 | 5,97 | 28,34 | |
| Urgence de l'hôpital | 13 687 | 64 705 | 1 066 | 79 459 |
| | 0,99 | 4,66 | 0,08 | 5,72 |
| | 17,23 | 81,43 | 1,34 | |
| | 6,05 | 5,58 | 57,51 | |
| Clinique de l'hôpital | 34 191 | 120 876 | 0 | 155 067 |
| | 2,46 | 8,71 | 0,00 | 11,17 |
| | 22,05 | 77,95 | 0,00 | |
| | 15,11 | 10,42 | 0,00 | |
| Hôpital durant l'hospitalisation | 15 396 | 15 146 | 0 | 30 542 |
| | 1,11 | 1,09 | 0,00 | 2,20 |
| | 50,41 | 49,59 | 0,00 | |
| | 6,80 | 1,31 | 0,00 | |
| Au travail | 2 952 | 17 997 | 0 | 20 949 |
| | 0,21 | 1,30 | 0,00 | 1,51 |
| | 14,09 | 85,91 | 0,00 | |
| | 1,30 | 1,55 | 0,00 | |
| À l'école | 1 525 | 4 743 | 0 | 6 268 |
| | 0,11 | 0,34 | 0,00 | 0,45 |
| | 24,33 | 75,67 | 0,00 | |
| | 0,67 | 0,41 | 0,00 | |
| À la maison | 20 157 | 23 263 | 0 | 43 419 |
| | 1,45 | 1,68 | 0,00 | 3,13 |
| | 46,42 | 53,58 | 0,00 | |
| | 8,91 | 2,01 | 0,00 | |
| Par téléphone | 49 978 | 14 672 | 0 | 19 650 |
| | 0,36 | 1,06 | 0,00 | 1,42 |
| | 25,33 | 74,67 | 0,00 | |
| | 2,20 | 1,26 | 0,00 | |
| Pharmacie | 5 105 | 18 498 | 0 | 23 603 |
| | 0,37 | 1,33 | 0,00 | 1,70 |
| | 21,63 | 78,37 | 0,00 | |
| | 2,26 | 1,59 | 0,00 | |
| Centr. de réhabilitation | 781 | 231 | 0 | 1 012 |
| | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,07 |
| | 77,16 | 22,84 | 0,00 | |
| | 0,34 | 0,02 | 0,00 | |
| Total | 226 311 | 1 160 083 | 1 854 | 1 388 248 |
| | 16,30 | 83,56 | 0,13 | 100,00 |

Légende :

- population estimée
- pourcentage sur le total
- pourcentage sur la ligne
- pourcentage sur la colonne

Tableau 103

Lieu de la dernière consultation, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987

| Niveau de revenu | | Lieu de la dernière consultation | | | | | | | Population estimée |
|------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| | | Bureau privé | Clinique hospitalière | CLSC Centre de santé | Urgence de l'Hôpital | À la maison | Durant l'hospitalisat. | Autres** | |
| Très pauvre | N | 83 549 | 16 748 | 6 683 | 9 729 | 8 907 | 2 838 | 4 706 | 133 160 |
| | % | 62,7 | 12,6 | 5,0 | 7,3 | 6,7 | 2,1 | 3,5 | 100,0 |
| Pauvre | N | 127 914 | 27 890 | 11 125 | 12 041 | 7 274 | 4 358 | 14 029 | 204 631 |
| | % | 62,5 | 13,6 | 5,4 | 5,9 | 3,6 | 2,1 | 6,9 | 100,0 |
| À revenu moyen | N | 445 138 | 71 582 | 36 853 | 34 311 | 14 026 | 11 448 | 33 097 | 646 455 |
| | % | 68,9 | 11,1 | 5,7 | 5,3 | 2,2 | 1,8 | 5,1 | 100,0 |
| Riche | N | 189 896 | 23 125 | 17 338 | 14 253 | 5 269 | 8 673 | 15 526 | 274 170 |
| | % | 69,3 | 8,4 | 6,3 | 5,2 | 1,9 | 3,2 | 5,7 | 100,0 |
| Total | N | 846 496 | 139 344 | 72 000 | 70 334 | 35 476 | 27 318 | 67 449 | 1 258 417 |
| | % | 67,3 | 11,1 | 5,7 | 5,6 | 2,8 | 2,2 | 5,4 | 100,0 |

Valeurs manquantes: 151 215

** Autres: au travail, à l'école, par téléphone, pharmacie, centre de réadaptation, magasin d'aliments naturels, CSST

N = population estimée

Tableau 104
Lieu de la dernière consultation, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Lieu de la dernière consultation | | | | | | | Population estimée |
|--------------|----------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------|
| | | Bureau privé | Clinique hospitalière | CLSC Centre de santé | Urgence de l'hôpital | À la maison | Durant l'hospitalisat. | Autres** | |
| 0-14 | H | 93 125 | 16 299 | 11 801 | 14 267 | 4 223 | 1 329 | 8 241 | 149 285 |
| | % | 62,4 | 10,9 | 7,9 | 9,6 | 2,8 | 0,9 | 5,5 | 100,0 |
| | F | 101 309 | 10 353 | 9 993 | 8 497 | 2 316 | 734 | 6 874 | 140 076 |
| | % | 72,3 | 7,4 | 7,1 | 6,1 | 1,7 | 0,5 | 4,9 | 100,0 |
| 15-24 | H | 45 164 | 9 133 | 4 215 | 8 123 | 853 | 347 | 3 428 | 71 263 |
| | % | 63,4 | 12,8 | 5,9 | 11,4 | 1,2 | 0,5 | 4,8 | 100,0 |
| | F | 65 424 | 13 966 | 8 182 | 5 501 | 56 | 1 036 | 4 976 | 99 141 |
| | % | 66,0 | 14,1 | 8,3 | 5,6 | 0,1 | 1,0 | 5,0 | 100,0 |
| 25-44 | H | 115 080 | 17 831 | 10 305 | 11 528 | 2 310 | 4 556 | 10 143 | 171 753 |
| | % | 67,0 | 10,4 | 6,0 | 6,7 | 1,4 | 2,7 | 5,9 | 100,0 |
| | F | 189 250 | 27 667 | 14 791 | 11 990 | 3 850 | 3 971 | 15 082 | 266 601 |
| | % | 70,9 | 10,4 | 5,5 | 4,5 | 1,4 | 1,5 | 5,7 | 100,0 |
| 45-64 | H | 74 542 | 19 235 | 4 632 | 5 691 | 3 662 | 4 983 | 6 256 | 119 001 |
| | % | 62,6 | 16,2 | 3,9 | 4,8 | 3,1 | 4,2 | 5,3 | 100,0 |
| | F | 125 992 | 20 760 | 9 109 | 8 401 | 4 401 | 4 449 | 9 369 | 182 481 |
| | % | 69,0 | 11,4 | 5,0 | 4,6 | 2,4 | 2,4 | 5,1 | 100,0 |
| 65-74 | H | 30 601 | 4 424 | 2 411 | 2 187 | 2 578 | 2 080 | 1 827 | 46 108 |
| | % | 66,4 | 9,6 | 5,2 | 4,7 | 5,6 | 4,5 | 4,0 | 100,0 |
| | F | 48 048 | 10 381 | 2 095 | 1 636 | 5 699 | 3 343 | 4 184 | 75 386 |
| | % | 63,7 | 13,8 | 2,8 | 2,2 | 7,6 | 4,4 | 5,6 | 100,0 |
| 75 et + | H | 17 872 | 791 | 214 | 1 424 | 2 727 | 1 900 | 585 | 25 513 |
| | % | 70,1 | 3,1 | 0,8 | 5,6 | 10,7 | 7,5 | 2,3 | 100,0 |
| | F | 21 182 | 4 226 | 2 942 | 214 | 10 744 | 1 813 | 958 | 42 079 |
| | % | 50,3 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 25,5 | 4,3 | 2,3 | 100,0 |
| Total | H | 376 383 | 67 713 | 33 578 | 43 220 | 16 353 | 15 194 | 30 481 | 582 922 |
| | % | 64,6 | 11,6 | 5,8 | 7,4 | 2,8 | 2,6 | 5,2 | 100,0 |
| | F | 551 207 | 87 354 | 47 111 | 36 238 | 27 066 | 15 348 | 41 741 | 805 965 |
| | % | 68,4 | 10,8 | 5,9 | 4,5 | 3,4 | 1,9 | 5,2 | 100,0 |

Valeurs manquantes: 9 490 chez les hommes; 11 255 chez les femmes

** Autres: au travail, à l'école, par téléphone, pharmacie, centre de réadaptation, magasin d'aliments naturels, CSST

Tableau 105
**Distribution des fréquences de consultation au cours des 4 derniers mois,
 selon le niveau de revenu*, Québec, 1987****

| Niveau de revenu | | Nombre de consultations | | | Population estimée |
|------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | 1 fois | 2-3 fois | Plus de 3 fois | |
| Très pauvre | N | 161 702 | 75 869 | 72 170 | 309 741 |
| | % | 52,2 | 24,5 | 23,3 | 100 |
| Pauvre | N | 295 055 | 139 616 | 109 563 | 544 234 |
| | % | 54,2 | 25,7 | 20,1 | 100 |
| À revenu moyen | N | 747 056 | 305 572 | 275 854 | 1 328 481 |
| | % | 56,2 | 23,0 | 20,8 | 100 |
| Riche | N | 266 201 | 109 753 | 85 933 | 461 888 |
| | % | 57,6 | 23,8 | 18,6 | 100 |
| Total | N | 1 470 015 | 630 810 | 543 519 | 2 644 344 |
| | % | 55,6 | 23,9 | 20,5 | 100 |

Valeurs manquantes: 447 383

** Parmi les problèmes de santé qui ont demandé au moins 1 consultation

N = population estimée

Tableau 106
Motif de consultation, selon l'âge et le sexe, Québec, 1987

| Âge | Sexe | Prévention Examens | Appareil resp. | Appareil digestif | Syst. ostéo-artic. | Lésions & accidents | Appareil circulat. | Organes des sens |
|--------------|----------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 0-14 | H | 44 794 | 26 495 | 15 645 | 2 577 | 7 460 | 595 | 17 106 |
| | % | 29,8 | 17,7 | 10,4 | 1,7 | 5,0 | 0,4 | 11,4 |
| | F | 42 332 | 21 780 | 15 049 | 3 476 | 5 314 | 535 | 14 113 |
| | % | 29,9 | 15,4 | 10,6 | 2,5 | 3,8 | 0,4 | 10,0 |
| 15-24 | H | 17 799 | 8 550 | 7 275 | 5 787 | 12 868 | 0 | 4 324 |
| | % | 24,4 | 11,7 | 10,0 | 7,9 | 17,6 | 0,0 | 5,9 |
| | F | 17 626 | 15 847 | 10 598 | 5 155 | 4 989 | 1 030 | 3 631 |
| | % | 17,6 | 15,8 | 10,6 | 5,1 | 5,0 | 1,0 | 3,6 |
| 25-44 | H | 27 885 | 18 681 | 19 016 | 22 936 | 22 797 | 2 210 | 7 276 |
| | % | 16,0 | 10,7 | 10,9 | 13,1 | 13,0 | 1,3 | 4,2 |
| | F | 45 168 | 17 738 | 21 223 | 27 764 | 11 434 | 2 717 | 9 815 |
| | % | 16,7 | 6,6 | 7,9 | 10,3 | 4,2 | 1,0 | 3,6 |
| 45-64 | H | 22 991 | 8 279 | 9 408 | 17 912 | 7 135 | 19 315 | 5 137 |
| | % | 19,0 | 6,8 | 7,8 | 14,8 | 5,9 | 15,9 | 4,2 |
| | F | 31 895 | 12 785 | 15 840 | 24 846 | 7 504 | 20 538 | 5 382 |
| | % | 17,1 | 6,9 | 8,5 | 13,3 | 4,0 | 11,0 | 2,9 |
| 65-74 | H | 10 680 | 4 734 | 5 066 | 1 383 | 2 074 | 5 119 | 2 858 |
| | % | 23,0 | 10,2 | 10,9 | 3,0 | 4,5 | 11,1 | 6,2 |
| | F | 12 948 | 5 022 | 5 789 | 9 019 | 986 | 12 758 | 1 555 |
| | % | 17,0 | 6,6 | 7,6 | 11,9 | 1,3 | 16,8 | 2,0 |
| 75 et + | H | 5 633 | 2 666 | 2 437 | 2 977 | 702 | 3 238 | 922 |
| | % | 21,8 | 10,3 | 9,4 | 11,5 | 2,7 | 12,5 | 3,6 |
| | F | 10 449 | 2 328 | 2 849 | 3 764 | 899 | 9 100 | 3 215 |
| | % | 24,8 | 5,5 | 6,8 | 8,9 | 2,1 | 21,6 | 7,6 |
| Total | H | 129 782 | 69 413 | 58 846 | 53 571 | 53 037 | 30 476 | 37 623 |
| | % | 21,9 | 11,7 | 9,9 | 9,1 | 9,0 | 5,2 | 6,4 |
| | F | 160 429 | 75 500 | 71 348 | 74 024 | 31 127 | 46 677 | 37 712 |
| | % | 19,7 | 9,3 | 8,7 | 9,1 | 3,8 | 5,7 | 4,6 |

Tableau 107
Motif de consultation, selon le niveau de revenu*, Québec, 1987

| Niveau de revenu | | Prévention Examens | Appareil resp. | Appareil digestif | Syst. ostéo-artic. | Lésions & accidents | Appareil circulat. | Organes des sens |
|------------------|----------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Très pauvre | N | 23 071 | 16 202 | 13 256 | 8 097 | 8 541 | 11 803 | 6 293 |
| | % | 17,2 | 12,1 | 9,9 | 6,0 | 6,4 | 8,8 | 4,7 |
| Pauvre | N | 36 490 | 19 214 | 16 564 | 16 683 | 11 155 | 17 331 | 10 975 |
| | % | 17,7 | 9,3 | 8,0 | 8,1 | 5,4 | 8,4 | 5,3 |
| À revenu moyen | N | 139 427 | 74 778 | 62 373 | 62 669 | 40 363 | 28 807 | 36 113 |
| | % | 21,2 | 11,4 | 9,5 | 9,5 | 6,1 | 4,4 | 5,5 |
| Riche | N | 63 755 | 23 369 | 25 613 | 25 779 | 16 524 | 10 126 | 14 075 |
| | % | 23,0 | 8,4 | 9,2 | 9,3 | 6,0 | 3,6 | 5,1 |
| Total | N | 265 546 | 133 563 | 117 806 | 113 228 | 76 585 | 68 068 | 67 457 |
| | % | 20,7 | 10,5 | 9,2 | 8,9 | 6,0 | 5,3 | 5,3 |

| Âge | Sexe | Gross.P.P. Org. gén. f. | Troubles mentaux | Affections cutanées | Malaises, m. de tête | Mal. endoc. & métabol. | Autres | Population estimée |
|---------|------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| 0-14 | H | 0 | 1 864 | 5 802 | 132 | 0 | 27 664 | 150 134 |
| | % | 0,0 | 1,2 | 3,9 | 0,1 | 0,0 | 18,4 | 100,0 |
| | F | 1 151 | 3 975 | 6 056 | 2 384 | 0 | 25 217 | 141 383 |
| | % | 0,8 | 2,8 | 4,3 | 1,7 | 0,0 | 17,8 | 100,0 |
| 15-24 | H | 0 | 1 028 | 3 442 | 1 515 | 92 | 10 413 | 73 091 |
| | % | 0,0 | 1,4 | 4,7 | 2,1 | 0,1 | 12,4 | 100,0 |
| | F | 11 427 | 2 680 | 4 618 | 2 034 | 130 | 20 597 | 100 360 |
| | % | 11,4 | 2,7 | 4,6 | 2,0 | 0,1 | 20,5 | 100,0 |
| 25-44 | H | 0 | 7 809 | 5 774 | 3 781 | 1 183 | 35 431 | 174 778 |
| | % | 0,0 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 0,7 | 20,3 | 100,0 |
| | F | 40 141 | 12 248 | 9 687 | 9 312 | 2 186 | 60 450 | 269 883 |
| | % | 14,9 | 4,5 | 3,6 | 3,5 | 0,8 | 22,4 | 100,0 |
| 45-64 | H | 0 | 3 048 | 1 926 | 2 082 | 1 915 | 22 193 | 121 342 |
| | % | 0,0 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 18,3 | 100,0 |
| | F | 11 610 | 9 511 | 5 577 | 3 532 | 6 154 | 31 239 | 786 415 |
| | % | 6,2 | 5,1 | 3,0 | 1,9 | 3,3 | 16,8 | 100,0 |
| 65-74 | H | 0 | 417 | 977 | 115 | 1 970 | 10 949 | 46 352 |
| | % | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 0,3 | 4,3 | 23,6 | 100,0 |
| | F | 1 480 | 2 037 | 2 159 | 351 | 2 429 | 19 542 | 76 085 |
| | % | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 0,5 | 3,2 | 25,7 | 100,0 |
| 75 et + | H | 0 | 714 | 198 | 289 | 920 | 5 208 | 25 904 |
| | % | 0,0 | 2,8 | 0,8 | 1,1 | 3,6 | 20,1 | 100,0 |
| | F | 491 | 645 | 339 | 282 | 676 | 7 042 | 42 079 |
| | % | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 16,7 | 100,0 |
| Total | H | 0 | 14 880 | 18 120 | 7 914 | 5 666 | 111 858 | 591 602 |
| | % | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 1,3 | 1,0 | 18,9 | 100,0 |
| | F | 66 300 | 31 096 | 28 434 | 17 896 | 11 575 | 164 086 | 816 204 |
| | % | 8,1 | 3,8 | 3,5 | 2,2 | 1,4 | 20,1 | 100,0 |

| Niveau de revenu | | Gross.P.P. Org. gén. f. | Troubles mentaux | Affections cutanées | Malaises, m. de tête | Mal. endoc. & métabol. | Autres | Population estimée |
|---------------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Très pauvre | N | 4 279 | 5 810 | 4 676 | 3 241 | 1 711 | 27 315 | 134 298 |
| | % | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 2,4 | 1,3 | 20,3 | 100,0 |
| Pauvre | N | 9 394 | 10 788 | 6 439 | 4 313 | 4 216 | 41 300 | 206 665 |
| | % | 4,6 | 5,2 | 3,1 | 2,1 | 2,0 | 20,0 | 100,0 |
| À revenu moyen | N | 33 863 | 19 096 | 19 985 | 11 989 | 8 051 | 119 958 | 657 472 |
| | % | 5,2 | 2,9 | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 18,3 | 100,0 |
| Riche | N | 13 154 | 6 496 | 10 895 | 5 255 | 1 114 | 61 696 | 277 853 |
| | % | 4,7 | 2,3 | 3,9 | 1,9 | 0,4 | 22,2 | 100,0 |
| Total | N | 60 690 | 42 190 | 41 995 | 24 799 | 15 093 | 250 269 | 1 276 288 |
| | % | 4,8 | 3,3 | 3,3 | 1,9 | 1,2 | 19,6 | 100,0 |

N = population estimée
Valeurs manquantes: 131697

Tableau 108

Motif de consultation, selon le lieu de consultation, Québec, 1987

| Lieu de consultation | | Prévention Examens | Appareil resp. | Appareil digestif | Syst. ostéo-artic. | Lésions & accidents | Appareil circulat. | Organes des sens |
|----------------------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Bur. privé | N | 239 390 | 80 824 | 93 488 | 83 689 | 30 963 | 44 568 | 49 598 |
| | % | 25,8 | 8,7 | 10,1 | 9,0 | 3,3 | 4,8 | 5,4 |
| CLSC Cent. santé | N | 17 874 | 13 606 | 5 086 | 5 346 | 5 095 | 3 986 | 5 063 |
| | % | 22,2 | 16,9 | 6,3 | 6,6 | 6,3 | 4,9 | 6,3 |
| Urg. (CH) | N | 1 812 | 11 689 | 6 540 | 5 317 | 22 305 | 2 493 | 6 858 |
| | % | 2,3 | 14,7 | 8,2 | 6,7 | 28,1 | 3,1 | 8,6 |
| Clin. hosp. | N | 18 192 | 13 034 | 10 849 | 20 386 | 15 240 | 8 912 | 8 435 |
| | % | 11,8 | 8,4 | 7,0 | 13,2 | 9,8 | 5,8 | 5,5 |
| Durant hosp. | N | 88 | 1 508 | 2 868 | 2 870 | 2 508 | 3 563 | 1 179 |
| | % | 0,3 | 4,9 | 9,4 | 9,4 | 8,2 | 11,7 | 3,9 |
| À la maison | N | 4 768 | 5 105 | 2 830 | 2 802 | 1 506 | 6 542 | 541 |
| | % | 11,0 | 11,8 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 15,1 | 1,3 |
| Autres** | N | 6 372 | 14 595 | 7 389 | 5 276 | 3 817 | 4 429 | 3 475 |
| | % | 8,9 | 20,4 | 10,4 | 7,4 | 5,4 | 6,2 | 4,9 |
| Total | N | 288 496 | 140 361 | 129 051 | 125 686 | 81 434 | 74 493 | 75 149 |
| | % | 20,8 | 10,1 | 9,3 | 9,1 | 5,9 | 5,4 | 5,4 |

** Autres lieux: au travail, à l'école, par téléphone, pharmacie, centre de réadaptation, magasin d'aliments naturels, CSST
Valeurs manquantes: 20 551

Tableau 109

Distribution des problèmes de santé, selon la fréquence de consultation au cours des 4 derniers mois, Québec, 1987

| Nombre de consultations | | Problèmes de santé | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Troubles mentaux | Maladies endocr. métabol. | Maux de tête, fatigue | Organes des sens | Maladies appareil circulat. | Maladies appareil respirat. | Maladies appareil digestif |
| 1 fois | N | 127 384 | 58 648 | 95 134 | 65 276 | 222 048 | 235 308 | 142 326 |
| | % | 7,9 | 3,6 | 5,9 | 4,1 | 13,8 | 14,6 | 8,8 |
| 2-3 fois | N | 64 767 | 24 230 | 29 129 | 26 410 | 122 636 | 64 536 | 66 492 |
| | % | 9,5 | 3,5 | 4,3 | 3,9 | 17,9 | 9,4 | 9,7 |
| Plus de 3 fois | N | 73 271 | 17 885 | 26 599 | 14 795 | 85 229 | 49 951 | 37 211 |
| | % | 12,7 | 3,1 | 4,6 | 2,6 | 14,8 | 8,7 | 6,5 |
| Au moins une consultation | N | 265 422 | 100 763 | 150 862 | 106 481 | 429 913 | 349 795 | 246 029 |
| | % | 9,2 | 3,5 | 5,3 | 3,7 | 15,0 | 12,2 | 8,6 |

| Lieu de consultation | | Gross.P.P. Org. gén. f. | Troubles mentaux | Affections cutanées | Malaises, m. de tête | Mal. endoc. & métabol. | Autres** | Population estimée |
|----------------------|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Bur. privé | N | 47 360 | 31 458 | 30 043 | 17 479 | 11 200 | 167 200 | 927 260 |
| | % | 5,1 | 3,4 | 3,2 | 1,9 | 1,2 | 18,0 | 100,0 |
| CLSC | N | 3 835 | 2 021 | 3 276 | 843 | 836 | 13 823 | 80 689 |
| Cent. santé | % | 4,8 | 2,5 | 4,1 | 1,1 | 1,0 | 17,1 | 100,0 |
| Urg. (CH) | N | 1 987 | 633 | 3 080 | 996 | 349 | 15 400 | 79 459 |
| | % | 2,5 | 0,8 | 3,9 | 1,3 | 0,4 | 19,4 | 100,0 |
| Clin. hosp. | N | 7 081 | 4 901 | 6 517 | 2 469 | 1 680 | 37 123 | 154 821 |
| | % | 4,6 | 3,2 | 4,2 | 1,6 | 1,1 | 24,0 | 100,0 |
| Durant hosp. | N | 1 926 | 2 213 | 291 | 320 | 1 364 | 9 845 | 30 542 |
| | % | 6,3 | 7,3 | 1,0 | 1,1 | 4,5 | 32,2 | 100,0 |
| À la maison | N | 57 | 1 515 | 1 290 | 1 745 | 1 062 | 13 509 | 43 270 |
| | % | 0,1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 31,5 | 100,0 |
| Autres** | N | 3 313 | 2 886 | 1 435 | 1 413 | 809 | 16 184 | 71 393 |
| | % | 4,6 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 22,7 | 100,0 |
| Total | N | 65 558 | 45 626 | 45 931 | 25 265 | 17 300 | 273 084 | 1 387 435 |
| | % | 4,7 | 3,3 | 3,3 | 1,8 | 1,3 | 19,7 | 100,0 |

** Autres lieux: au travail, à l'école, par téléphone, pharmacie, centre de réadaptation, magasin d'aliments naturels, CSST

Valeurs manquantes: 20 551

N = population estimée

| | | Problèmes de santé | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|
| Nombre de consultations | | Maladies de la peau | Maladies syst. ostéo- artic. | Lésions et accidents | Organes génitaux féminins | Autres | Population estimée |
| | | | | | | | |
| | % | 7,2 | 12,7 | 5,3 | 2,0 | 14,1 | 100 |
| 2-3 fois | N | 33 210 | 103 170 | 48 485 | 10 320 | 92 114 | 685 50 |
| | % | 4,8 | 15,1 | 7,1 | 1,5 | 13,4 | 100 |
| Plus de 3 fois | N | 13 907 | 117 942 | 42 919 | 6 452 | 89 237 | 575 397 |
| | % | 2,4 | 20,5 | 7,5 | 1,1 | 15,5 | 100 |
| Au moins une consultation | N | 163 525 | 425 824 | 177 175 | 48 442 | 408 083 | 2 872 314 |
| | % | 5,7 | 14,1 | 6,2 | 1,7 | 14,2 | 100 |

Valeurs manquantes = 115 579

N = population estimée

Achévé d'imprimer en octobre 1988,
sur les presses des Ateliers graphiques
Virage inc. à Québec

Composition typographique: Compélec inc.

Et la santé, ça va ?

Oui ! et très bien même ! En effet, au cours des dix dernières années les Québécois vivent plus longtemps et plus en forme. Nous tendons également à devenir des buveurs plus modérés et ne comptons que 33% d'irréductibles fumeurs.

Voilà quelques-unes des conclusions-chocs qui ressortent d'une enquête d'envergure menée par Santé Québec au cours de l'année 1987 auprès de 13 700 foyers.

La rédaction du rapport de cette enquête, divisé en deux tomes, a demandé la participation d'une soixantaine de chercheurs.

Le tome 1 contient l'analyse des données fournies par l'enquête. Elles portent notamment sur :

- *les éléments qui affectent la santé, tels le tabac et les drogues ;*
- *les problèmes de santé, dont l'emphysème, le rhume des foies et la dépression ;*
- *leurs conséquences, telles que la consommation de médicaments et le recours aux services de santé.*

Le tome 2 contient exclusivement des graphiques et des tableaux détaillés. Cette annexe statistique représente un apport important à l'analyse présentée au tome 1.